

## 第6章 肝炎ウイルス検診の状況

### 1 肝炎ウイルス検診の受診の有無と受診機会[複数回答]


今までに肝炎ウイルス検診を「受けたことがある」と回答した人は23.8%であった。

「受けたことがある」と回答した人(1,730人)に、受診機会を聞いたところ、「市区町村が実施した検診」の割合が30.9%と最も高く、次いで、「病院や人間ドックで個人的に行う検診」27.1%、「職場における検診」23.7%、「通院先の血液検査」15.5%であった。(図 -6-1)

問 今までに、市区町村や職場などで、血中のB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスを調べる肝炎ウイルス検診を受けましたか。

問 どこで肝炎ウイルス検診を受けましたか。

図 -6-1 肝炎ウイルス検診の受診の有無と受診機会[複数回答]




(1) 肝炎ウイルス検診の受診の有無 - 性・年齢階級別

肝炎ウイルス検診を受けた人の割合は、男性より女性の方が高い

肝炎ウイルス検診の受診の有無を性別でみると、「受けた」人の割合は、男性 20.6%、女性 26.7%と女性の方が5ポイント以上高くなっている。年齢階級別にみると、男女とも、60代の「受けた」人の割合が最も高く、それぞれ29.4%、37.3%となっている。(図 -6-2)

図 -6-2 肝炎ウイルス検診の受診の有無 - 性・年齢階級別




(2) 肝炎ウイルス検診の受診の有無 - 健康・食生活改善意欲別

健康・食生活改善意欲が十分にある人は、肝炎ウイルス検診を「受けた」人の割合が3割

肝炎ウイルス検診の受診の有無を健康・食生活改善意欲別にみると、健康・食生活改善意欲が十分にある人は、「受けた」割合が27.4%と、約3割であった(図 -6-3)

図 -6-3 肝炎ウイルス検診の受診の有無 - 健康・食生活改善意欲別




(3) 肝炎ウイルス検診の受診機会[複数回答] - 性・年齢階級別

男性は「職場における検診」、女性は「市区町村が実施した検診」の割合が最も高い

肝炎ウイルス検診の受診機会を性別で見ると、男性は「職場における検診」の割合が32.8%、女性は「市区町村が実施した検診」の割合が36.4%で、それぞれ最も高かった。

年齢階級別にみると、「職場における検診」の割合が、男性は20代～50代、女性は20代～30代が高かった(約36～63%)。(図 -6-4)

図 -6-4 肝炎ウイルス検診の受診機会[複数回答] - 性・年齢階級別



(4) 肝炎ウイルス検診の受診機会[複数回答] - 就業状況別

主に仕事をしている人は、「職場における検診」が4割

肝炎ウイルス検診の受診機会を就業状況別にみると、「職場における検診」の割合が最も高いのは、主に仕事をしている人で、41.6%となっている。

「市区町村が実施した検診」の割合が高いのは、家事などのほかに仕事をしている人(39.4%)、家事(専業)の人(40.6%)、その他(幼児、高齢者、病気等)の人(42.8%)となっている。(表 -6-1)

表 -6-1 肝炎ウイルス検診の受診機会[複数回答] - 就業状況別

|                | 総<br>数           | 職<br>場<br>に<br>お<br>け<br>る<br>検<br>診 | 市<br>区<br>町<br>村<br>が<br>実<br>施<br>し<br>た<br>検<br>診 | 的<br>病<br>に<br>行<br>う<br>検<br>診<br><br>院<br>や<br>人<br>間<br>ド<br>ック<br>で<br>個<br>人 | そ<br>の<br>他 | 通<br>院<br>先<br>の<br>血<br>液<br>検<br>査 | 無<br>回<br>答 |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 総数             | 100.0<br>(1,730) | 23.7                                 | 30.9  | 27.1  | 3.2         | 15.5                                 | 1.8         |
| 労働力人口          | 100.0<br>(1,000) | 34.9                                 | 23.4  | 26.8  | 2.7         | 12.6                                 | 1.1         |
| 就業者            | 100.0<br>(977)   | 35.1                                 | 23.1  | 26.8  | 2.5         | 12.9                                 | 1.1         |
| 主に仕事           | 100.0<br>(733)   | 41.6                                 | 17.6  | 27.3  | 2.0         | 11.5                                 | 1.1         |
| 家事などのほかに仕事     | 100.0<br>(218)   | 16.1                                 | 39.4  | 25.2  | 3.2         | 17.4                                 | 1.4         |
| その他            | 100.0<br>(23)    | 8.7                                  | 47.8  | 26.1  | 4.3         | 17.4                                 | -           |
| 仕事を探していた       | 100.0<br>(23)    | 26.1                                 | 34.8  | 26.1  | 13.0        | -                                    | -           |
| 非労働力人口         | 100.0<br>(712)   | 8.4                                  | 41.2  | 27.5  | 4.1         | 19.5                                 | 2.5         |
| 家事(専業)         | 100.0<br>(384)   | 8.1                                  | 40.6  | 29.9  | 4.9         | 16.7                                 | 2.3         |
| その他(幼児、高齢、病気等) | 100.0<br>(320)   | 8.1                                  | 42.8  | 25.0  | 2.2         | 23.4                                 | 2.5         |


- ・労働力人口の就業者のうち、通学のかたわらに仕事については、母集団が3人のため省略した。
- ・非労働力人口のうち、通学のみについては、母集団が8人のため省略した。

## 2 肝炎ウイルス検診の受診理由[複数回答]

肝炎ウイルス検診を受診した人(1,730人)のうち、受診機会が職場における検診、市区町村が実施した検診、病院や人間ドックで個人的に行う検診、その他と回答した人(1,442人)に受けた理由を聞いたところ、「市区町村の健診内容にあったから」が最も高く30.0%、次いで、「職場の健診内容にあったから」が27.0%となっている。(図 -6-5)

問 肝炎ウイルス検診を受けた理由は何ですか。

図 -6-5 肝炎ウイルス検診の受診理由[複数回答]



(1) 肝炎ウイルス検診の受診理由[複数回答] - 性・年齢階級別

男性は「職場の健診内容にあったから」、女性は「市区町村の健診内容にあったから」の割合が最も高い

肝炎ウイルス検診の受診理由を性別にみると、男性では、「職場の健診内容にあったから」が最も高く 35.9%、女性では、「市区町村の健診内容にあったから」が 36.7%と最も高くなっている。

年齢階級別にみると、20代～60代男性、20代～30代女性は「職場の健診内容にあったから」、70代以上男性、40代以上女性は、「市区町村の健診内容にあったから」の割合が最も高くなっている。(表 -6-2)

表 -6-2 肝炎ウイルス検診の受診理由[複数回答] - 性・年齢階級別


|        | 総数               | 年齢的に検診の必要性を感じたから | 肝炎を早期に見つけた | 過去に輸血歴があったから | 気になる症状があった | 職場の健診内容にあった | 市区町村の健診内容にあった | 受診の通知が来たから | 医師に受診を勧められたから | 家族・友人等に受診を勧められたから | 雑誌・インターネット・広報等)を見聞きしたから | 検診を勧める情報(テレビ・インターネット・広報)費用が安かったから | その他  | 無回答  |
|--------|------------------|------------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| 総数     | 100.0<br>(1,442) | 15.9             | 14.7       | 5.2          | 3.1        | 27.0        | 30.0          | 7.6        | 11.9          | 3.3               | 3.3                     | 3.4                               | 11.4 | 2.1  |
| 男      | 100.0<br>(605)   | 20.7             | 15.7       | 4.3          | 3.8        | <u>35.9</u> | 20.7          | 7.6        | 12.6          | 3.3               | 2.3                     | 3.0                               | 9.1  | 1.3  |
| 20～29歳 | 100.0<br>(24)    | 4.2              | 4.2        | 4.2          | 4.2        | <u>50.0</u> | 4.2           | -          | 8.3           | 8.3               | -                       | 4.2                               | 16.7 | -    |
| 30～39歳 | 100.0<br>(58)    | 5.2              | 10.3       | 3.4          | 8.6        | <u>62.1</u> | 5.2           | 6.9        | 6.9           | 5.2               | -                       | 3.4                               | 6.9  | 1.7  |
| 40～49歳 | 100.0<br>(110)   | 20.0             | 9.1        | 3.6          | 3.6        | <u>49.1</u> | 9.1           | 5.5        | 10.9          | 3.6               | 1.8                     | 3.6                               | 10.0 | 0.9  |
| 50～59歳 | 100.0<br>(128)   | 20.3             | 16.4       | 3.9          | 3.1        | <u>46.9</u> | 12.5          | 3.9        | 7.8           | 2.3               | 2.3                     | 2.3                               | 14.8 | 0.8  |
| 60～69歳 | 100.0<br>(147)   | 26.5             | 17.7       | 4.8          | 1.4        | <u>33.3</u> | 29.3          | 7.5        | 11.6          | 4.1               | 3.4                     | 1.4                               | 4.8  | 0.7  |
| 70～79歳 | 100.0<br>(112)   | 23.2             | 23.2       | 5.4          | 6.3        | 3.6         | <u>37.5</u>   | 13.4       | 22.3          | 1.8               | 2.7                     | 4.5                               | 6.3  | 2.7  |
| 80歳以上  | 100.0<br>(26)    | 30.8             | 19.2       | 3.8          | -          | 7.7         | <u>38.5</u>   | 19.2       | 23.1          | -                 | 3.8                     | 3.8                               | 11.5 | 3.8  |
| 女      | 100.0<br>(837)   | 12.4             | 14.0       | 5.9          | 2.6        | 20.7        | <u>36.7</u>   | 7.6        | 11.4          | 3.2               | 3.9                     | 3.7                               | 13.0 | 2.7  |
| 20～29歳 | 100.0<br>(33)    | -                | 3.0        | -            | 3.0        | <u>45.5</u> | -             | 9.1        | -             | 6.1               | 3.0                     | 3.0                               | 33.3 | 3.0  |
| 30～39歳 | 100.0<br>(95)    | 7.4              | 7.4        | 2.1          | 3.2        | <u>42.1</u> | 10.5          | 4.2        | 9.5           | 2.1               | 2.1                     | 2.1                               | 29.5 | 2.1  |
| 40～49歳 | 100.0<br>(167)   | 14.4             | 9.0        | 1.8          | 1.8        | 26.9        | <u>28.7</u>   | 9.0        | 5.4           | 4.8               | 3.0                     | 3.0                               | 16.2 | 3.0  |
| 50～59歳 | 100.0<br>(156)   | 12.8             | 19.2       | 5.1          | 2.6        | 23.7        | <u>40.4</u>   | 7.1        | 8.3           | 1.9               | 6.4                     | 3.8                               | 10.3 | 1.9  |
| 60～69歳 | 100.0<br>(223)   | 14.3             | 18.8       | 8.1          | 3.1        | 13.0        | <u>48.0</u>   | 6.3        | 12.6          | 4.0               | 4.0                     | 5.4                               | 6.7  | 2.2  |
| 70～79歳 | 100.0<br>(131)   | 13.0             | 14.5       | 11.5         | 3.1        | 4.6         | <u>50.4</u>   | 9.2        | 22.1          | 2.3               | 3.8                     | 3.1                               | 7.6  | 3.1  |
| 80歳以上  | 100.0<br>(30)    | 13.3             | 10.0       | 6.7          | -          | 3.3         | <u>43.3</u>   | 13.3       | 23.3          | -                 | 3.3                     | 3.3                               | 6.7  | 10.0 |

### 3 肝炎ウイルス検診を受診しなかった理由[複数回答]

肝炎ウイルス検診を受診しなかった人(4,430人)に、検診を受けなかった理由を聞いたところ、「自分は感染していないと思うので、受ける必要性を感じないから」が50.4%と最も高く、次いで、「肝炎ウイルス検診があることを知らなかったから」が39.4%、「どこで受けられるかわからないから」が16.6%であった。(図 -6-6)

問 肝炎ウイルス検診を受けなかった理由は何ですか。

図 -6-6 肝炎ウイルス検診を受診しなかった理由[複数回答]





(1) 肝炎ウイルス検診を受診しなかった理由[複数回答] - 性・年齢階級別

男女とも「自分は感染していないと思うので、受ける必要性を感じないから」の割合が最も高い

肝炎ウイルス検診を受診しなかった理由を性・年齢階級別にみると、男女とも、「自分は感染していないと思うので、受ける必要性を感じないから」の割合が最も高く、それぞれ 53.3%、47.7%となっている。

「肝炎ウイルス検診があることを知らなかったから」の割合は、女性の 20 代(51.3%)、30 代(56.3%)、40 代(48.2%)で高かった。(表 -6-3)

表 -6-3 肝炎ウイルス検診を受診しなかった理由[複数回答] - 性・年齢階級別

|        | 総数               | から<br>こと<br>を<br>知ら<br>な<br>検<br>診<br>が<br>た<br>あ | 肝<br>炎<br>ウ<br>イ<br>ル<br>ス<br>検<br>診<br>が<br>あ | 要<br>と<br>自<br>分<br>は<br>感<br>染<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い<br>必<br>い | か<br>ど<br>か<br>ら<br>な<br>い<br>受<br>け<br>ら<br>れ<br>る<br>か<br>わ | か<br>ど<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>検<br>査<br>を<br>す<br>る | ら<br>時<br>間<br>が<br>と<br>れ<br>な<br>か<br>つ<br>た<br>か | 費<br>用<br>が<br>か<br>か<br>る<br>か<br>ら | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|--------|------------------|---|--|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 総数     | 100.0<br>(4,430) | 39.4  | 50.4   | 16.6   | 11.9  | 7.6   | 9.3   | 3.7                                  | 6.1         |             |
| 男      | 100.0<br>(2,139) | 34.5  | <u>53.3</u>                                    | 15.7   | 10.7  | 9.1   | 9.2   | 4.1                                  | 5.8         |             |
| 20～29歳 | 100.0<br>(273)   | 38.1  | 57.1   | 15.4   | 11.4  | 11.7  | 11.0  | 3.3                                  | 4.8         |             |
| 30～39歳 | 100.0<br>(415)   | 39.0  | 49.4   | 22.4   | 12.8  | 12.0  | 13.5  | 4.6                                  | 5.5         |             |
| 40～49歳 | 100.0<br>(349)   | 38.1  | 43.0   | 16.3   | 11.7  | 16.0  | 11.5  | 4.6                                  | 4.6         |             |
| 50～59歳 | 100.0<br>(298)   | 34.2  | 48.0   | 15.8   | 12.8  | 11.7  | 10.4  | 4.0                                  | 4.4         |             |
| 60～69歳 | 100.0<br>(362)   | 28.7  | 60.5   | 12.4   | 8.8   | 3.9   | 6.1   | 3.6                                  | 8.0         |             |
| 70～79歳 | 100.0<br>(312)   | 32.7  | 59.9   | 11.5   | 8.3   | 2.2   | 4.2   | 4.2                                  | 6.7         |             |
| 80歳以上  | 100.0<br>(124)   | 25.8  | 63.7   | 11.3   | 5.6   | 0.8   | 2.4   | 4.0                                  | 8.1         |             |
| 女      | 100.0<br>(2,291) | 43.9  | <u>47.7</u>                                    | 17.4   | 13.1  | 6.2   | 9.4   | 3.4                                  | 6.4         |             |
| 20～29歳 | 100.0<br>(304)   | <u>51.3</u>                                       | 46.4   | 22.4   | 11.2  | 9.2   | 15.1  | 3.6                                  | 3.9         |             |
| 30～39歳 | 100.0<br>(407)   | <u>56.3</u>                                       | 42.8   | 24.1   | 16.5  | 7.6   | 14.3  | 2.0                                  | 4.7         |             |
| 40～49歳 | 100.0<br>(355)   | <u>48.2</u>                                       | 40.6   | 20.3   | 15.2  | 8.2   | 10.4  | 3.1                                  | 6.8         |             |
| 50～59歳 | 100.0<br>(311)   | 43.4  | 48.2   | 16.7   | 16.4  | 7.7   | 7.4   | 2.9                                  | 5.8         |             |
| 60～69歳 | 100.0<br>(388)   | 35.6  | 52.3   | 13.1   | 12.4  | 5.2   | 7.0   | 4.1                                  | 5.4         |             |
| 70～79歳 | 100.0<br>(354)   | 33.3  | 52.8   | 11.6   | 9.9   | 2.0   | 5.1   | 4.0                                  | 9.9         |             |
| 80歳以上  | 100.0<br>(162)   | 34.6  | 53.7   | 9.9  | 6.8   | 0.6   | 2.5   | 4.9                                  | 9.9         |             |




## 第7章 糖尿病

### 1 糖尿病り患状況

健診等の結果、糖尿病といわれたことがあるか聞いたところ、「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』などといわれたことがある」割合が8.3%、「『糖尿病である』といわれたことがある」が4.9%であった。それ以外は「何もいわれたことがない」が大部分を占めており73.7%となっている。（図 -7-1）

問 あなたは、健診等の検査の結果、糖尿病といわれたことがありますか。

図 -7-1 糖尿病り患状況




(注)統計比率を合算した比率(13.1%)は、個々の数値を合算して求めているため、比率の内訳の合計とは一致しない。

(1) 糖尿病り患状況 - 性・年齢階級別

「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』などといわれたことがある」、「『糖尿病である』といわれたことがある」割合は、いずれも女性より男性の方が高い

糖尿病り患状況を性・年齢階級別にみると、「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』などといわれたことがある」は、男性 11.5%、女性 5.3%、「『糖尿病である』といわれたことがある」は、男性 6.5%、女性 3.4%と、いずれも男性の方が高くなっている。(図 -7-2)

図 -7-2 糖尿病り患状況 - 性・年齢階級別



## 2 糖尿病の治療の有無と治療内容[複数回答]

『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がある』『糖尿病になりかけている』などといわれたことがある」または『糖尿病である』といわれたことがある」と答えた人(952人)に、治療を受けたことがあるかを聞いたところ、「現在、受けている」割合は、44.4%であった。


一方で、「以前に受けたことがあるが、現在受けていない」(12.4%)、「ほとんど受けたことがない」(8.8%)、「まったく受けたことがない」(28.0%)を合わせた「現在、治療を受けていない」割合は、49.3%であった。

また、「現在、受けている」または「以前に受けたことがあるが、現在受けていない」と答えた人(541人)に治療(していた)の内容を聞いたところ、「食事指導」が76.2%で最も高く、次いで「飲みぐすり」が65.6%、「運動指導」が50.6%となっている。(図 -7-3)

問 糖尿病の治療を受けたことがありますか。

問 治療の内容はどのようなものでしたか。

図 -7-3 糖尿病の治療の有無と治療内容[複数回答]



(注)統計比率を合算した比率(49.3%)は、個々の数値を合算して求めているため、比率の内訳の合計とは一致しない。


(1) 糖尿病の治療の有無 - 糖尿病り患状況別

「『糖尿病である』といわれたことがある」人は、糖尿病の治療を「現在、受けている」割合が8割

糖尿病の治療の有無について、糖尿病り患状況別にみると、「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』」などといわれたことがある人は、「まったく受けたことがない」が最も高く43.4%となっている。

一方で、「糖尿病である」といわれたことがある人は、「現在、受けている」割合が84.4%と最も高くなっている。(図 -7-4)

図 -7-4 糖尿病の治療の有無 - 糖尿病り患状況別




(2) 糖尿病の治療内容[複数回答] - 糖尿病り患状況別

「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』」などといわれたことがある人、「糖尿病である」といわれたことがある人、いずれも治療内容は「食事指導」の割合が最も高い

糖尿病の治療の内容について、糖尿病り患状況別にみると、「『血糖値が高い』『糖尿病の境界型』『糖尿病の気がする』『糖尿病になりかけている』」などといわれたことがある人、「糖尿病である」といわれたことがある人ともに、「食事指導」の割合が最も高くそれぞれ 75.1%、76.8%となっている。(図 -7-5)

図 -7-5 糖尿病の治療内容[複数回答] - 糖尿病り患状況別




### 3 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答]

糖尿病について知っていることを聞いたところ、「眼の網膜にある血管がつまったり出血しやすくなり、放置し症状が進むと失明にいたることがある」の割合が69.0%で最も高く、次いで、「腎臓の機能が低下し、放置し症状が進むと人工透析が必要な状態になる。」が66.8%となっている。(図 -7-6)

問 糖尿病が悪化することで、次のような状態になることをご存知ですか。

図 -7-6 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答]





(1) 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答] - 性・年齢階級別

糖尿病について知っていることを性・年齢階級別にみると、男性は、「腎臓の機能が低下し、放置し症状が進むと人工透析が必要な状態になる」が最も高く、66.5%となっている。

女性は、「眼の網膜にある血管がつまったり出血しやすくなり、放置し症状が進むと失明にいたることがある」が最も高く72.4%で、特に40代～60代女性は、8割を超えている。

糖尿病について知っていることを性・年齢階級別にみると、男女とも、20代、80代が、「いずれも知らない」の割合が、約2割となっている。(表 -7-1)

表 -7-1 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答] - 性・年齢階級別

|        | 総<br>数           | 腎臓の機能が低下し、人工透析、放置が必要な状態になる | 手足のしびれや痛み、感覚が鈍くなる | 目の出血や失明、白内障、網膜剥離 | 心臓、血管の病気を起こしやすい | 心臓、血管の病気を起こしやすい | 脳血管が詰まりやすくなる | いずれも知らない | 無回答 |
|--------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 総数     | 100.0<br>(7,259) | 66.8                       | 42.2              | 69.0             | 48.5            | 44.5            | 10.9         | 4.1      |     |
| 男      | 100.0<br>(3,426) | <u>66.5</u>                | 42.3              | 65.2             | 49.5            | 45.7            | 12.3         | 3.6      |     |
| 20～29歳 | 100.0<br>(393)   | 53.4                       | 33.1              | 39.7             | 46.1            | 42.7            | <u>24.2</u>  | 4.1      |     |
| 30～39歳 | 100.0<br>(589)   | 66.4                       | 39.0              | 54.8             | 44.7            | 41.3            | 15.1         | 4.4      |     |
| 40～49歳 | 100.0<br>(591)   | 73.9                       | 45.9              | 70.9             | 50.4            | 46.7            | 9.3          | 2.2      |     |
| 50～59歳 | 100.0<br>(509)   | 69.7                       | 45.4              | 76.6             | 53.0            | 47.5            | 8.1          | 1.6      |     |
| 60～69歳 | 100.0<br>(616)   | 67.9                       | 44.3              | 76.5             | 52.9            | 49.7            | 7.8          | 2.4      |     |
| 70～79歳 | 100.0<br>(532)   | 67.1                       | 44.4              | 69.0             | 51.9            | 48.3            | 9.6          | 5.8      |     |
| 80歳以上  | 100.0<br>(187)   | 55.6                       | 40.1              | 54.5             | 41.7            | 37.4            | <u>22.5</u>  | 8.0      |     |
| 女      | 100.0<br>(3,833) | 67.1                       | 42.0              | <u>72.4</u>      | 47.5            | 43.5            | 9.6          | 4.5      |     |
| 20～29歳 | 100.0<br>(447)   | 53.7                       | 32.7              | 45.9             | 44.7            | 39.4            | <u>19.2</u>  | 7.6      |     |
| 30～39歳 | 100.0<br>(611)   | 69.9                       | 37.0              | 67.1             | 44.4            | 39.9            | 9.8          | 4.3      |     |
| 40～49歳 | 100.0<br>(632)   | 72.6                       | 50.5              | <u>81.0</u>      | 49.4            | 44.5            | 6.5          | 0.9      |     |
| 50～59歳 | 100.0<br>(542)   | 71.6                       | 44.6              | <u>86.0</u>      | 52.4            | 45.4            | 4.4          | 1.7      |     |
| 60～69歳 | 100.0<br>(724)   | 71.3                       | 46.7              | <u>82.5</u>      | 51.8            | 48.2            | 6.1          | 4.0      |     |
| 70～79歳 | 100.0<br>(595)   | 65.7                       | 43.0              | 71.6             | 46.6            | 46.4            | 8.6          | 7.6      |     |
| 80歳以上  | 100.0<br>(267)   | 52.8                       | 29.2              | 56.6             | 35.2            | 33.3            | <u>23.6</u>  | 8.6      |     |

(2) 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答] - 糖尿病り患状況別

「糖尿病である」といわれたことがある人は、いずれの項目も知っている割合が高い

糖尿病について知っていることを糖尿病り患状況別にみると、「糖尿病である」といわれたことがある人は、「いずれも知らない」を除くすべての項目において、割合が最も高くなっている。(表 -7-2)

表 -7-2 糖尿病が原因で起こる疾病の認知度[複数回答] - 糖尿病り患状況別

|  | 総<br>数           | 必し腎<br>要症臓<br>な状の<br>状が機<br>態進能<br>にむが<br>なと低<br>人工下<br>工透、<br>析放<br>が置 | るが手<br>鈍足の<br>くの<br>なし<br>なれ<br>なれ<br>どの<br>痛み<br>状、<br>が感<br>覚 | 明りま<br>に、っ<br>い放た<br>いた置<br>るし出<br>こと状<br>があ進<br>るむく<br>となつ<br>失 | 眼まの<br>のの<br>網膜に<br>あ血<br>る血<br>管が<br>なつ<br>す | どな心<br>のり臓<br>の心、<br>臓心<br>病筋<br>を梗<br>起塞<br>こや<br>し狭<br>や心<br>やす<br>す症<br>すい<br>なく | すり脳<br>い、の<br>脳血<br>梗管<br>な<br>つ<br>な<br>まり<br>を起<br>やす<br>こす<br>く<br>や<br>な | い<br>ず<br>れ<br>も<br>知<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------|
| 総数   | 100.0<br>(7,259) | 66.8  | 42.2  | 69.0   | 48.5  | 44.5  | 10.9   | 4.1                                  |             |
| 「血糖値が高い」「糖尿病の境界型」「糖尿病の<br>気がある」「糖尿病になりかけている」などとい<br>われたことがある | 100.0<br>(599)   | 72.3  | 53.8  | 78.1   | 61.9  | 59.4  | 5.5  | 0.8                                  |             |
| 「糖尿病である」といわれたことがある   | 100.0<br>(353)   | <u>85.3</u>   | <u>72.2</u>   | <u>87.3</u>  | <u>74.5</u>                                   | <u>72.5</u>   | 2.8  | 1.7                                  |             |
| 何もいわれたことはない  | 100.0<br>(5,352) | 68.4  | 41.7  | 71.1   | 48.3  | 44.0  | 10.6   | 2.1                                  |             |
| 健診、検査を受けていない   | 100.0<br>(735)   | 57.3  | 32.0  | 53.6   | 37.0  | 33.5  | 23.5   | 1.6                                  |             |

## 第8章 結核

### 1 胸のレントゲン検査の受診の有無と受診しなかった理由〔複数回答〕

この1年以内に胸のレントゲン検査を受けたことがあるか聞いたところ、「受けたことがある」の割合が62.4%、「受けたことがない」が35.2%であった。(図 -8-1)

「受けたことがない」人(2,552人)に受診しなかった理由を聞いたところ、「現在、健康に問題はなく、必要性を感じないから」の割合が最も高く55.1%、次いで「受ける機会がないから」が30.4%と続いた。(図 -8-2)

問 あなたは、この1年以内に胸のレントゲン検査を受けたことがありますか。

問 胸のレントゲン検査を受けなかったのはなぜですか。

図 -8-1 胸のレントゲン検査受診の有無





図 8-2 胸のレントゲン検査を

受診しなかった理由〔複数回答〕




(1) 胸のレントゲン検査の受診の有無 - 性・年齢階級別

胸のレントゲン検査を受診した割合は、女性より男性の方が高い

胸のレントゲン検査の受診の有無を性・年齢階級別にみると、「受けたことがある」割合は、男性が66.4%、女性が58.9%と男性の方が5ポイント以上高くなっている。

一方「受けたことがない」の割合が、男性では20代(47.6%)、女性では20代(47.4%)、30代(50.6%)が、約5割となっている。(図 -8-3)

図 -8-3 胸のレントゲン検査の受診の有無 - 性・年齢階級別



(2) 胸のレントゲン検査の受診の有無 - 就業状況別

主に仕事をしている人は、胸のレントゲン検査を受診した割合が7割

胸のレントゲン検査の受診の有無を就業状況別にみると、「受けたことがある」の割合は、主に仕事をしている人が67.3%、その他（幼児、高齢、病気等）の人が64.3%で、6割を超えている。（表 -8-1）

表 -8-1 胸のレントゲン検査の受診の有無 - 就業状況別

|                | 総<br>数           | 受<br>け<br>た<br>こ<br>と<br>が<br>あ<br>る | 受<br>け<br>た<br>こ<br>と<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 総数             | 100.0<br>(7,259) | 62.4                                 | 35.2                                 | 2.4         |
| 労働力人口          | 100.0<br>(4,562) | 64.1                                 | 33.4                                 | 2.5         |
| 就業者            | 100.0<br>(4,429) | 64.7                                 | 32.7                                 | 2.6         |
| 主に仕事           | 100.0<br>(3,535) | <u>67.3</u>                          | 30.0                                 | 2.7         |
| 家事などのほかに仕事     | 100.0<br>(742)   | 56.9                                 | 41.4                                 | 1.8         |
| 通学のかたわらに仕事     | 100.0<br>(69)    | 34.8                                 | 62.3                                 | 2.9         |
| その他            | 100.0<br>(83)    | 50.6                                 | 48.2                                 | 1.2         |
| 仕事を探していた       | 100.0<br>(133)   | 44.4                                 | 54.1                                 | 1.5         |
| 非労働力人口         | 100.0<br>(2,609) | 59.6                                 | 38.3                                 | 2.1         |
| 家事(専業)         | 100.0<br>(1,307) | 55.5                                 | 43.0                                 | 1.5         |
| 通学のみ           | 100.0<br>(101)   | 56.4                                 | 40.6                                 | 3.0         |
| その他(幼児、高齢・病気等) | 100.0<br>(1,201) | <u>64.3</u>                          | 33.0                                 | 2.7         |

(3) 胸のレントゲン検査を受診しなかった理由[複数回答] - 性・年齢階級別

男女とも「現在、健康に問題はなく、必要性を感じないから」の割合が最も高い

胸のレントゲン検査を受診しなかった理由を性・年齢階級別にみると、男女とも「現在、健康に問題はなく、必要性を感じないから」の割合が、それぞれ 58.5%、52.7%と最も高くなっている。

また、「受ける機会がないから」の割合は、男性 26.1%、女性 33.4%で、女性の方が約 7 ポイント高くなっている。(表 -8-2)

表 -8-2 胸のレントゲン検査を受診しなかった理由[複数回答] - 性・年齢階級別

|        | 総数               | 感は現<br>じなく、<br>健康に<br>必要に<br>性を<br>問題 | らのだ<br>かこ<br>わで<br>か受<br>らけ<br>なら<br>いれ<br>かる | か受<br>らけ<br>る<br>機<br>会<br>が<br>な<br>い | た時<br>か間<br>ら<br>が<br>と<br>れ<br>な<br>か<br>つ | る医<br>か者<br>らに<br>か<br>か<br>つ<br>て<br>い | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|--------|------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|
| 総数     | 100.0<br>(2,552) | 55.1                                  | 6.5   | 30.4                                   | 11.7  | 8.2                                     | 4.9         | 3.4         |
| 男      | 100.0<br>(1,069) | <u>58.5</u>                           | 6.8   | <u>26.1</u>                            | 13.8  | 8.9                                     | 4.1         | 2.9         |
| 20～29歳 | 100.0<br>(187)   | 64.2                                  | 10.2  | 36.4                                   | 9.6   | 1.1                                     | 1.6         | 3.7         |
| 30～39歳 | 100.0<br>(198)   | 57.6                                  | 10.6  | 35.9                                   | 13.1  | 0.5                                     | 5.6         | 1.5         |
| 40～49歳 | 100.0<br>(164)   | 46.3                                  | 6.7   | 31.7                                   | 23.2  | 4.3                                     | 9.1         | 2.4         |
| 50～59歳 | 100.0<br>(135)   | 53.3                                  | 4.4   | 20.0                                   | 27.4  | 7.4                                     | 3.7         | 4.4         |
| 60～69歳 | 100.0<br>(193)   | 62.2                                  | 7.3   | 18.1                                   | 9.3   | 18.1                                    | 2.1         | 2.1         |
| 70～79歳 | 100.0<br>(131)   | 60.3                                  | 0.8   | 14.5                                   | 6.1   | 19.1                                    | 3.8         | 5.3         |
| 80歳以上  | 100.0<br>(56)    | 78.6                                  | -   | 7.1                                    | -   | 26.8                                    | 1.8         | -           |
| 女      | 100.0<br>(1,483) | <u>52.7</u>                           | 6.3   | <u>33.4</u>                            | 10.2  | 7.8                                     | 5.5         | 3.8         |
| 20～29歳 | 100.0<br>(212)   | 54.7                                  | 8.0   | 47.6                                   | 5.7   | 0.9                                     | 3.8         | 3.3         |
| 30～39歳 | 100.0<br>(309)   | 48.9                                  | 10.7  | 47.9                                   | 9.1   | 1.0                                     | 7.1         | 3.6         |
| 40～49歳 | 100.0<br>(251)   | 45.0                                  | 6.8   | 36.3                                   | 19.1  | 4.0                                     | 6.8         | 3.2         |
| 50～59歳 | 100.0<br>(209)   | 52.2                                  | 6.2   | 30.1                                   | 19.1  | 6.2                                     | 6.2         | 1.9         |
| 60～69歳 | 100.0<br>(231)   | 57.6                                  | 2.6   | 23.4                                   | 5.6   | 13.9                                    | 5.2         | 3.9         |
| 70～79歳 | 100.0<br>(167)   | 62.3                                  | 4.8   | 15.6                                   | 3.0   | 18.0                                    | 1.8         | 6.6         |
| 80歳以上  | 100.0<br>(98)    | 54.1                                  | -   | 10.2                                   | 3.1   | 25.5                                    | 7.1         | 7.1         |

(注) その他の意見(計 110 件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

妊娠中(23 件)

面倒くさい・無関心(10 件)

寝たきり、高齢、病気などで検査に行けなかった(10 件)


市区町村や健保組合の検査内容が変わった、検査項目に入っていない(5 件)

## 2 結核に関する知識の認知度[複数回答]

結核について、以下のようなことを知っているか聞いたところ、知っている割合で最も高いのは「周りの人にうつすおそれのある病気である」で72.0%、次いで「日本では、かかる人がまだたくさんいる」「きちんと薬を飲めば治る病気である」がともに61.3%で続いた。(図 -8-4)

問 あなたは、結核について次のようなことをご存知ですか。

図 -8-4 結核に関する知識の認知度[複数回答]



(1) 結核に関する知識の認知度[複数回答] - 性・年齢階級別

男女とも「周りの人にうつすおそれのある病気である」ことを知っている割合が最も高い

結核に関する知識の認知度を性・年齢階級別にみると、男女とも「周りの人にうつすおそれのある病気である」ことを知っている割合が、それぞれ68.1%、75.5%と最も高くなっている。

男性の20代は、「いずれも知らない」の割合が19.3%と、総数の割合(6.2%)より10ポイント以上高くなっている。(表 -8-3)

表 -8-3 結核に関する知識の認知度[複数回答] - 性・年齢階級別

|        | 総数               | 日本では、だいたくさんいる | 感染とは限らない | きちんと薬を飲めば治る | 発見が遅れると重症化する | 周りの人にうつすおそれのある病気である | 2週間以上、咳が続くと可能性がある | 多い   | 東京では若い人の結核が多い | 相談は保健所で受けられる | 治療費の一部を公費で負担する制度がある | 感染した場合は入院しない | いずれも知らない | 無回答 |
|--------|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------|-----|
| 総数     | 100.0<br>(7,259) | 61.3          | 42.0     | 61.3        | 50.8         | <u>72.0</u>         | 34.7              | 25.5 | 23.0          | 10.3         | 59.7                | <u>6.2</u>   | 3.3      |     |
| 男      | 100.0<br>(3,426) | 59.5          | 40.4     | 57.9        | 51.6         | <u>68.1</u>         | 30.6              | 23.9 | 21.9          | 10.4         | 55.1                | 7.4          | 3.5      |     |
| 20～29歳 | 100.0<br>(393)   | 45.5          | 28.8     | 39.7        | 40.7         | 53.7                | 21.6              | 14.8 | 9.9           | 8.1          | 38.2                | <u>19.3</u>  | 5.3      |     |
| 30～39歳 | 100.0<br>(589)   | 54.8          | 29.2     | 50.8        | 45.8         | 60.4                | 28.2              | 16.8 | 14.9          | 5.9          | 44.0                | 10.9         | 3.9      |     |
| 40～49歳 | 100.0<br>(591)   | 61.9          | 40.9     | 63.5        | 52.5         | 70.9                | 32.3              | 25.0 | 16.6          | 8.6          | 55.5                | 6.9          | 2.2      |     |
| 50～59歳 | 100.0<br>(509)   | 60.7          | 42.4     | 63.9        | 56.6         | 69.5                | 36.5              | 31.2 | 22.2          | 12.6         | 60.7                | 6.3          | 1.2      |     |
| 60～69歳 | 100.0<br>(616)   | 62.5          | 45.1     | 63.0        | 56.2         | 74.4                | 30.0              | 28.4 | 26.6          | 12.8         | 67.4                | 2.6          | 2.6      |     |
| 70～79歳 | 100.0<br>(532)   | 68.2          | 51.1     | 62.0        | 55.6         | 75.8                | 33.1              | 26.1 | 34.0          | 13.2         | 60.0                | 2.6          | 5.5      |     |
| 80歳以上  | 100.0<br>(187)   | 57.2          | 46.0     | 57.2        | 49.7         | 66.8                | 29.4              | 19.8 | 32.6          | 12.3         | 55.1                | 4.8          | 5.9      |     |
| 女      | 100.0<br>(3,833) | 62.9          | 43.5     | 64.4        | 50.1         | <u>75.5</u>         | 38.3              | 27.0 | 24.1          | 10.1         | 63.8                | 5.1          | 3.2      |     |
| 20～29歳 | 100.0<br>(447)   | 48.5          | 25.3     | 41.2        | 35.6         | 62.4                | 28.6              | 13.9 | 11.9          | 4.9          | 47.0                | 9.8          | 7.6      |     |
| 30～39歳 | 100.0<br>(611)   | 57.4          | 37.3     | 57.9        | 43.7         | 73.6                | 38.6              | 20.9 | 18.5          | 7.9          | 58.6                | 6.9          | 3.8      |     |
| 40～49歳 | 100.0<br>(632)   | 73.7          | 47.0     | 69.8        | 48.9         | 80.7                | 50.3              | 28.3 | 18.4          | 7.8          | 66.1                | 4.1          | 1.4      |     |
| 50～59歳 | 100.0<br>(542)   | 67.0          | 50.9     | 77.7        | 54.1         | 79.3                | 39.5              | 33.8 | 22.9          | 10.5         | 71.4                | 2.8          | 0.9      |     |
| 60～69歳 | 100.0<br>(724)   | 66.4          | 49.4     | 73.3        | 58.4         | 79.0                | 40.1              | 35.8 | 33.0          | 14.4         | 74.7                | 3.0          | 2.1      |     |
| 70～79歳 | 100.0<br>(595)   | 65.9          | 48.4     | 65.5        | 57.3         | 79.5                | 35.5              | 28.4 | 35.0          | 13.6         | 63.5                | 2.7          | 4.5      |     |
| 80歳以上  | 100.0<br>(267)   | 50.9          | 38.2     | 52.1        | 45.3         | 63.3                | 24.7              | 18.7 | 24.7          | 9.4          | 53.6                | 11.2         | 3.4      |     |



(2) 結核に関する知識の認知度[複数回答] - 胸のレントゲン検査の受診の有無別

レントゲン検査を受けた人は、いずれの項目も知っている割合が高い

結核に関する知識の認知度を胸のレントゲン検査の受診の有無別にみると、「いずれも知らない」を除くすべての項目において、受けたことがある人の方が、受けたことがない人に比べて、知っている割合が高くなっている。(表 -8-4)

表 -8-4 結核に関する知識の認知度[複数回答] - 胸のレントゲン検査の受診の有無別

|          | 総<br>数           | た日本<br>くさん<br>では、<br>いい、<br>かかる<br>人が<br>まだ | と感<br>は染<br>限ら<br>ない<br>も<br>す<br>く<br>に<br>発<br>病<br>す<br>る | き<br>ち<br>ん<br>と<br>薬<br>を<br>飲<br>め<br>ば<br>治<br>る<br>病<br>気<br>で<br>あ<br>る | 発<br>見<br>が<br>遅<br>れ<br>る<br>と<br>重<br>症<br>化<br>す<br>る | あ<br>る<br>周<br>り<br>の<br>人<br>に<br>う<br>つ<br>す<br>お<br>そ<br>れ<br>の<br>病<br>気<br>で<br>あ<br>る | 能<br>は<br>2<br>週<br>間<br>以<br>上<br>、<br>咳<br>が<br>続<br>く<br>と<br>き<br>性<br>が<br>あ<br>る | い<br>東<br>京<br>で<br>は<br>若<br>い<br>人<br>の<br>結<br>核<br>が<br>多<br>い | 相<br>談<br>は<br>保<br>健<br>所<br>で<br>受<br>け<br>ら<br>れ<br>る | す<br>治<br>療<br>費<br>の<br>一<br>部<br>を<br>公<br>費<br>で<br>負<br>担<br>す<br>る<br>制<br>度<br>が<br>あ<br>る | 感<br>染<br>し<br>た<br>場<br>合<br>、<br>入<br>院<br>し<br>な<br>け<br>れ<br>ば<br>な<br>ら<br>な<br>い<br>こ<br>と<br>が<br>あ<br>る | い<br>ず<br>れ<br>も<br>知<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|----------|------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------|
| 総数       | 100.0<br>(7,259) | 61.3  | 42.0   | 61.3   | 50.8   | 72.0  | 34.7   | 25.5   | 23.0   | 10.3   | 59.7  | 6.2                                  | 3.3         |
| 受けたことがある | 100.0<br>(4,531) | 66.9  | 45.7   | 65.5   | 55.8   | 75.7  | 37.3   | 27.9   | 26.2   | 11.8   | 64.3  | 4.6                                  | 0.8         |
| 受けたことがない | 100.0<br>(2,552) | 55.1  | 37.9   | 57.5   | 44.9   | 69.8  | 32.0   | 22.8   | 18.6   | 8.2  | 55.0  | 9.2                                  | 2.3         |