第1回1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会

日 時:令和7年3月28日(金曜日)午後3時30分から午後5時まで

場 所:オンライン開催

会議次第

- 1 開会
- 2 委員紹介
- 3 1か月児健康診査に係る都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方
- 4 都内医療機関における1か月児健康診査の実施状況
- 5 都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性
- 6 閉会

(配布資料)

貸料 1	1 か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導人に向けた検討会設置要領

資料2 1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会委員名簿

資料3-1 1か月児健康診査支援事業(国資料)

資料3-2 1か月児健康診査に係る都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方

資料3-3 東京都における妊婦健康診査の実施体制と都内共通ルール

資料4-1 産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る実施状況調査(概要)

資料4-2 乳児(6~7か月・9~10か月)健康診査受診票(都様式)

資料4-3 1か月児健康診査問診票・1か月児健康診査票(国様式)

資料 5 都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性

(参考資料)

参考資料 1 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱・交付要綱 (1か月児健康診査部分抜粋)

参考資料 2 1 か月児健康診査マニュアル

1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会設置要領

令和7年1月20日付6福祉子家第2478号

第1 目的

都内で1か月児健康診査を受ける全ての乳児が、都内区市町村の区域を越えて健康診査を受けるれる体制の整備に向けて、各機関の役割や課題等について検討するため、1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会(「検討会」という。)を設置する。

第2 設置期間

令和7年2月1日から令和8年3月31日までとする。

第3 検討事項

検討会の検討事項は、以下のとおりとする。

- 1 1か月児健康診査の実施に係る現状と課題
- 2 各機関の役割及び連携体制
- 3 その他検討会が必要と定める事項

第4 構成

検討会は、福祉局長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。

また、委員の構成は、次のとおりとする。

- (1)関係団体の代表 5名以内
- (2) 関係行政機関の職員 5名以内

第5 任期

委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。 なお、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6 運営事項

検討会の運営に関する事項は検討会で協議の上、決定する。

第7 開催

検討会は、必要の都度福祉局長が招集し、開催する。

第8 事務

検討会の事務は、福祉局子供・子育て支援部家庭支援課において行う。

第9 関係者からの意見聴取等

検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴取できるほか、検討会への出席を求めることができる。

第10 検討会の公開 検討会の議事録・会議資料は公開する。

第11 その他

その他必要な事項は検討会で協議の上、決定する。

1 か月児健康診査に係る都内共通受診方式の 導入に向けた検討会委員一覧 委員名簿

(区分ごと五十音順、敬称略)

	区分	氏名	職名				
		イケノ ミツル 池野 充	順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科·思春期科 准教授				
	関係団体	カワカミ カズェ 川上 一恵	公益社団法人東京都医師会理事				
委		** ^{ワグ} マ** ^コ 澤田 雅子	東京小児科医会副会長、澤田こどもクリニック院長				
員	関係行政 機関	サカモト タケヒト 坂本 岳人	国分寺市子ども家庭部子育て相談室長				
		シマザキ ユウスケ 島崎 友介	瑞穂町福祉部子ども家庭センター課長				
		スズキ ノブヒロ 鈴木 宣広	中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センタ 一担当課長				

【事務局】

E		職名
セガワ 瀬川	松之	東京都福祉局子供・子育て施策推進担当部長
タニヤマ 谷山	ノリコ 倫子	東京都福祉局子供・子育て支援部調整担当課長
ヤマザキ 山 崎	gphen 貴博	東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課課長代理(多機関連携担当)
ハヤシ林	左香	東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子保健担当



- ***** 「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業

成育局 母子保健課

令和6年度補正予算 10億円 【令和5年度補正創設】

◆都内では居住自治体以外での出産が約半数 産婦や新生児が自治体の区域を越えて健診

方式の導入が効果的

を受診できるよう、広域的な都内共通受診

事業の目的

- 乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、乳児期 (「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か月児」及び「5歳児」に対 する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。
- ※ 本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援や体制整備に係る財政支援を行うことにより、「1か月児1及び「5歳児1の健康診査の早期の全国展開を目指す。

事業の概要

◆ 対象者

①1か月頃の乳児 及び ②5歳頃の幼児

◆ 内 容

地域における全ての上記①及び②に該当する乳幼児を対象に、健康診査の実施に係る費用について助成を行う。

① 1 か月児健診

実施方法:原則として個別健診

健診内容:身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、こどもの健康状態や育児の相談等

②5歳児健診

実施方法:原則として集団健診

健診内容:発達障害など心身の異常の早期発見(精神発達の状況、言語発達の遅れ等)、育児上問題となる事項、必要に応じ、専門相談等

◆ 留意事項

- (1) ①の健康診査の実施に当たっては、委託先の医療機関と連携を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより伴走型相談支援の効果的な実施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、こども家庭センターなどの関係機関とも連携しながら、必要な支援体制の整備を行うこと。
- (2)②の健康診査の実施に当たっては、健康診査の結果、発達障害等(発達障害等の疑いを含む。)と判定された幼児について、就学前までに必要な支援につなげることができるよう、関係部局や都道府県等とも協力しながら、地域における必要な支援体制の整備を行うこと。

実施主体等

◆ 実施主体:市町村 ◆ 補 助 率 : 国1/2、市町村1/2

◆ 補助単価: ① 6,000円/人(原則として個別健診) ② 5,000円/人(原則として集団健診)

48

「令和6年度補正予算母子保健対策関係予算の概要」P.1(こども家庭庁) (https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/)をもとに東京都作成

1 か月児健康診査に係る都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方

1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の公費負担制度導入に向けて妊婦健康診査の方式を参考に、検討を進めていく


検討スケジュール

回数	時期(予定)	議事(予定)
第1回	3月	・都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方 ・都内における1か月児健康診査の実施状況 ・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性
第2回	6 月	・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性 (健康診査の内容、公費負担額、受診券様式、事務の流れ等)
第3回	9月	・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性 (健康診査の内容、公費負担額、受診券様式、事務の流れ等) ・事務の手引き(案)及び標準要綱(案)の検討
	11月~12月	五者協協議(公費負担額、標準要綱案等)
第4回	2 月	・事務の手引き及び標準要綱(最終案)について ・医療機関向け及び都民向け周知について



検討結果を踏まえて、令和8年度中の都内共通受診方式の公費負担制度の導入を目指す

※産婦健康診査についても、同様に検討を進め、令和8年度中の都内共通受診方式の公費負担制度の導入を目指す



医療機関等への実施状況調査結果(概要)

○ 産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る実施状況調査

【実施方法】 郵送調査 (グーグルフォーム・メール・FAXで回答)

【調査対象】 都内で産婦人科、小児科を標榜している医療機関及び助産所(産婦人科・助産所と小児科で別に調査)

【調査期間】 10月2日(水)~11月11日(月)

【対象施設数】 <産婦人科・助産所> 921施設 <小児科> 2,380施設 【回答施設数】 <産婦人科・助産所> 224施設 <小児科> 564施設

【回答率】 <産婦人科・助産所> 24.3% <小児科> 23.7%

受診費用 実施している健診 ウ乳児1か月児健診 産婦2週間健診 産婦1か月健診 <産婦人科・助産所> 産婦への2週間健診 21.4% ■ 2.500円以下 10.4 10.8 11.1% 29.7 % ■ 2,500円超5,000円未満 産婦への1ヶ月健診 33.0% 14.6 31.7% 27.1 **■** 5.000 ⊞ % 28.4 乳児への1ヶ月児健診 28.1% 30.2% ■ 5,000円超7,500円未満 25.0 27.0 いずれも実施せず 50.0% - 7.500円以上 % 20.6% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% ■未回答・その他 平均単価:5,323円 平均単価:5,362円 平均単価: 4,498円 ウ 乳児1か月児健診 産婦2週間健診 <小児科> 産婦1か月健診 ■ 2.500円以下 4.4% 15.4 14.9 産婦への2週間健診 4.6% ■ 2.500円超5.000円未満 24.7% 14.9 11.5 産婦への1か月健診 8.3% - 5.000円 44.0% 44.7% 46.2% ■ 5.000円超7.500円未満 3.8% 11.5 乳児への1か月児健診 32.2% 19.1 - 7,500円以上 3% 17.0% いずれも実施せず 50.4% ■未回答・その他 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 平均単価:5,650円 平均単価: 4,661円 平均単価:3,337円


③ 健診の実施内容




④ 支援が必要な方の区市町村への引継ぎ

<産婦人科・助産所>


ア 引継ぎ実績




イ 引継ぎ方法



<小児科>



イ 引継ぎ方法



乳児(6~7か月)健康診査受診票(甲) 医療機関控

保護者の方へ

◎太わくの中は健康診査を受ける前に必ず記入してください。

◎この受診票は都内在住の方が、都内委託医療機関で利用できます。

(当てはまる項目に記入をするか〇をつけてください。)

出生時の状況 体重 g 週数 週(か月) 出生時の異常 なし・あり(BCG B型肝炎(1・2・3) | Eプワクチン(1・2・3) | 四種混合(1・2・3) 五種混合(1・2・3) 受けた予防接種 ロタウイルス ロタリックス(1価)(1・2・3) 本標混合(1・2・3) 小児用肺炎球菌ワクチン(1・2・3) 現在の栄養方法 母乳 回 粉ミルク 回(1日 ml) 離乳食 2 両手をついて背を丸くして、ほんのわずか座れますか はいいいえ おもちゃなどを差し出すと、自分から手をだしてつかみますか はいいいえ ネ 家族といるとき、話しかはるような声を出しますか はいいいえ 6 立ついている人が声をかけると、泣きやんだりうれしそうな様子を見せますか はいいいえ 6 音や呼びかけにふりむきますか はいいいえ はいいいえ ひとみがしっぽく見えますか いいえ・はいり ひきつけたことがありますか いいえ・はいり ひきつけたことがありますか いいえ・はい 熱 からなし 今までに入院をするような重い病気をしたことがありますか はいいくえ はい 11 お母さんの気持ちやからだの調子はよいほうですか はいいんえ 12 その他、何か相談したいことや心配なことがあったら書いてください 住所 電話 保護者名 乳児氏名 男·女 到.児牛年月日 年 В н 月齢 か月

左記の児の健康診査を依頼します。

都内委託医療機関 様

○区市町村のフォローを急ぐ場合は、 直接区市町村担当課へご連絡くだ さい。 ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	_		
#		体 重 g(10p以下 90p以上)	
は	診	身 長 cm(10p以下 90p以上)	
世	は	頭 囲 om	
ですかからカーボンは不要です。	感圧	カウプ指数	
からカー 横乳食の進み方 順調・順調・低調でない 呼吸音の 次 し・あり 東 常 なし・あり 東 神経の 次 は・あり 東 神経の 次 は・あり 東 神経の 次 は・あり 東 神経の 次 は・あり 上 を の他 中枢学的の 見 び 運動 本 とらない・ 大 でく と	で	大態 やせている・ ふつう・ ふとっている	
カーボンとは不要です。	か	食の進み方 順調 - 順調でない	
本	b)
不 東 四肢の異常 なし・あり() 競し なし・あり () 競し なし・あり () が ()	ボン)
です。	不)
神経学的所	で		
でくった。 総合 判定 問題なし・あり・疑い 今後の指導と 区市町村への 連絡 事項 3 他機関管理中 (保健 指導・栄養指導・経過観察・治治・ 保健 指導・栄養 指導・ 精密検査医療機関紹介) 4 乳児健康診査の結果は上記のとおりです。	強く書	見及び運動 2 引き起こし反応 正常・異常の疑い・異常	
い。 今後の指導と 区市町村への 連 絡 事 項 乳児健康診査の結 果は上記のとおり 所 在 地	てくだ		
果は上記のとおり		医Uffifeで 2 区市町村で行う (保健指導・栄養指導・経過観察・ ・ 特密検査医療機関紹介)	
		上記のとおり 令和 年 月 日	
医師名		医療機関名 医療機関コート	۲.

第2号様式

乳児(6~7か月)健康診査受診票(乙)

母子健康 手帳貼付

あなたのお子さんの健康診査は、右記のとおりです。キリトリ繰から切りはな して母子健康手帳の「乳児健康診査欄」にはってください。

出生時の状況	体重	g 週数	週((か月)	
出生時の異常	なし・あり()	
受けた予防接種	BCG B型肝炎	€(1•2•3) ヒブワ	プクチン(1・2・ 五	3) 四種混合(1·2· 種混合(1·2·3)	3)
受けたア防佞性	ロタウイルス ロタ	ヌリックス(1価)(1 ヌテック(5価)(1・2	2) 小児用	肺炎球菌ワクチン(1	2•3)
現在の栄養方法	母乳 回 粉	ミルク 回(1日	l ml)離	乳食 回	
2 両手をついて 3 おもちゃいると 4 家族いている 見せますかが 7 眼のみがだっ 8 ひとうづけたこ 10 今までにの 11 お母さんの	返りができます。 で背をみくして、同 で背を発し出すたるよう を差し出すたるよう も人が声をかける けにふりむきます。 おかしい(発視)と しばく見えますか、 院をするような重 気持ちやからだる か相談したいこと	ほんのわずか座れ けから手をだし にうな声を出します と、泣きやんだい か と思いますか い病気をしたこ の調子はよいほう	てつかみます すか リうれしそうな いいえ・はし とがあります うですか	はい・いいえ: 様子を はい・いいえ はい・いいえ・ いいえ・はい いいえ・はい いいカ・・ いいえ・はい いいえ・はい いいえ・はい はい・いいえ)
住所		電話	()	
フリガナ 乳児氏名		男·女	保護者名		
乳児生年月日	年 .	月 日	月齢		か月

保護者の方へ

健康診査の結果「今後の指導と区市町村への連絡事項」で「2 区市町村で行う」の欄に記入があったときは、居住する区市町村へ御連絡ください。

ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。

	体	重	g(10p以下 90p以上)
計	身	長	cm(10p以下 90p以上)
測	頭	囲	ст
	カウ	プ指数	
栄養	状態	やせ	ている・ ふつう・ ふとっている
離乳	食の	進み方	順調 ・ 順調でない
	皮质	雪の異常	なし・あり(関東 常 なし・あり()
診	心	音の異常	なし・あり() 腹部の なし・あり()
察所			なし・あり(雑聴の なし・あり(なし・あり(
見		見の疑い 色瞳孔	なし・あり() その他
		学的所 び運動	1 手をついてほんのわずか座る 座れる・ 座れない 2 引き起こし反応 正常・ 異常の疑い・ 異常 3 類に布をかけるテスト とる ・ とらない・ 左右差
*	※ 合	判定	問題なし・あり・疑 い ()
Z	市町	指導と 村への 事 項	1 当院で行う (保健指導・栄養指導・経過観察・治療・他機関紹介) (保健指導・栄養指導・経過・観察・ 特密検査医療機関紹介) 4 その他
	ま上言	を診査の このとおり	
	医療	在 地 機関名 師 名	医療機関コード

第3号様式

乳児(9~10か月)健康診査受診票(乙)

保護者の方へ

あなたのお子さんの健康診査は、右記のとおりです。キリトリ線から切りはな して母子健康手帳の「乳児健康診査欄」にはってください。

出生時の状況	体重 g 週数	週(か月)							
出生時の異常	なし・あり ()							
受けた予防接種	DCG D空肝灰(1-2-3)	ワクチン(1・2・3) 四種混合(1・2・3) 五種混合(1・2・3)							
支いたア防接性	ロタウイルス ロタリックス(1価)(1 ロタテック(5価)(1	[・2] 小児用肺炎球菌ワクチン(1・2・3)							
現在の栄養方法	離乳食 回・粉ミルク	回(1日 ml) • 母乳 回							
2 何かにつか 3 親指をつか。 4 イヤイヤ、 5 未前を呼ぶ。 7 眼の位置的 8 ひとみがた。 10 今までに入	5 床におもちゃや物を落としたとき、さがしますか はい・いいえ 6 名前を呼ぶとふりむきますか はい・いいえ 7 眼の位置がおかしい4射側と思いますか いいえ・はい 8 ひとみが白っぽく見えますか いいえ・はい 9 ひきつけたことがありますか いいえ・はい あり・なし うまでに入院をするような重い病気をしたことがありますか いた・はい 11 お母さんの気持ちやからだの調子(はよいほうですか はい・いいえ								
住所コード)							
住所	電影	适 ()							
フリガナ 乳児氏名	男∙女	て 保護者名							
乳児生年月日	年 月 日	月齢が月							

保護者の方へ

母子健康 手帳貼付

健康診査の結果「今後の指導と区市町村への連絡事項」で「2 区市町村で行う」の欄に記入があったときは、居住する区市町村へ御連絡ください。

ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。

		体	重	g(10p以下 90p以	.上)					
	計	身	長	cm(10p以下 90p以	(上)					
	測	頭	囲	cm							
		カウ	プ指数]						
	栄養	状態	やせ	ている ふつう ふ	とっている						
	離乳	食の	進み方	順調 ・順調でない							
		皮膚	骨の異常	なし・あり()	呼吸音(異 常	か なし る	あり()
	診	心音	音の異常	なし・あり()	腹部の 異 常	なして	あり()
	察所			なし・あり()	難聴の 疑い	なして	あり()
ŧ	見		見の疑い 色瞳孔	なし・あり()	その他	1				
・トリ線			学的所 び運動	1 周囲への関心や反応 2 パラシュート反応 3 積木をつかむテスト	=	正常	はっきりし 異常の こ つかま	疑い・	異常		
	彩	% 合	判定	問題なし ・ あ り	- 疑い)			
	区	市町	指導と 村への 事 項	1 当院で行う 2 区市町村で行う 3 他機関管理中	(保健指導・栄 (保健指 精密検査医	導 栄	養 指 導 (*)		過観察	-	
		ま上言	東診査の Rのとお ^し		0	年		月	日		
		医療	在 地 機関名 師 名						医療機関]]—	۴

第3号様式

乳児(9~10か月)健康診査

請求原票•結果通知票(丙)

医療機関へのお願い

都内委託医療機関 様

この請求原票(丙)は、当月分をおとりまとめのうえ、「妊婦・乳児健康診査総括票」と一緒に所定の方法によりご提出ください。

ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。

						_) I V V TINI I C.	あ光いに 下山い いいいい	. 1/20.0			
出生時の状況	体重 :	週数	週(か月)			体	重	g	(10p以下 90p	以上)		
出生時の異常	なし・ あり ()		計	身	長	cm	ı(10p以下 90p	以上)		
受けた予防接種	BCG B型肝炎(1	-2-3) ヒブワ	フクチン(1・2・ 五	3) 四種混合(1·2·3) 種混合(1·2·3))	浿	頭	囲	cm				
安けに予防接煙	ロタウイルス ロタリン	ックス(1価)(1 ック(5価)(1・2	2) 小児用	開放球菌ワクチン(1・2	•3)		カ	ウプ指数					
現在の栄養方法	離乳食 回・	分ミルク	回(1日 ml)	• 母乳 回		栄	養状態	tot	せている ふつう ふ	とっている			
1 はいはいをし		> 1. ++ 1.		はい・いいえ		離	乳食の	の進み方	順調 - 順調	でない			
3 親指をつか	ょらせれは立つてい って小さなものをつだ Sててパチパチなどを	いめますか	- そのまわれ	はい いいえ		折	皮	膚の異常	なし・あり()	呼吸音の 異 常	なし・あり	(
しますか	。ここハテハテゅこを ゃや物を落としたとき			はい いいえ はい いいえ		5 L		音の異常	なし・あり()	腹部の 異 常	なし・あり	(
6 名前を呼ぶ	とふりむきますか おかしい(斜視)と思		<i>,</i>	はいいいえいいえいいえん		お祭り	四	肢の異常	なし・あり()	難聴の 疑い	なしあり	(
8 ひとみが白・	っぽく見えますか ことがありますか		いいえ・はし	いいえ はい い(熱 ありなし)		い見	赤斗	視の疑い 1色瞳孔	なし・あり()	その他		
11 お母さんの	院をするような重い 気持ちやからだの証 か相談したいことや	子はよいほ	うですか	はい いいえ		で		圣学的所 及び運動 能	1 周囲への関心や反応 2 パラシュート反応 3 積木をつかむテスト	_	正常	まっきりしない 異常の疑い つかまない	
						く	総合	計 定	問題なし • あ り (・疑 い)	
住所コード						1	区市田	D指導と J村への · 事 項	1 当院で行う 2 区市町村で行う 3 他機関管理中	(保健指	・養指導・経過導 栄養・策機関紹介)・・・・・・・・・・・・を養期・・・・・を養期・・・を養用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<td>指導・</td><td>他機関紹介) 経 過 観 察 その他</td>	指導・	他機関紹介) 経 過 観 察 その他
住所		電話	E ()		果		康診査の 記のとお		П	年	月	B
フリガナ 乳児氏名			保護者名										
70,000								在 地					医療機関コード
乳児生年月日	年 月	日	月齢		か月								区/承1及(対)コート

資料4-3

1か月児健康診査問診票

※問診票は、主にお子さんの世話をなさっている方が記入してください。

の出	2751	よ、主にあすさんの世話をなさっている方が記入してください。 在胎週数 ()週						
状生態時		出生時体重()) 身						
2011年	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(はい・いいえ)					
器質			(はい・いいえ)					
的			(はい・いいえ)					
疾患	_		(いいえ・はい)					
の 確			(いいえ・はい)					
認		うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便(便色カード1番から3番)が続いていますか。	V. 1 1 2 1 1 1 1					
発	_		(はい・いいえ)					
達			(はい・いいえ)					
			(なし・あり(1日 本))					
		現在、お子さんのお父さん(パートナー)は喫煙をしていますか。	(なし・あり(1日 本))					
		窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。	(はい・いいえ)					
親	12	ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよ う 工夫をしていますか。	(はいいえ)					
1	13	あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)					
主な	14	赤ちゃんをいとおしいと感じますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)					
養	15	子育てについて不安や困難を感じることはありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)					
育	16	子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。	(はい・いいえ)					
者		(きょうだいがいらっしゃる方へ)きょうだいのことで相談したいことはありますか。	(いいえ・はい)					
や 子		お子さんのお母さんとお父さん(パートナー)は、協力し合って家事・育児をしていますか。	(そう思う・どちらかといえばそう思う・ どちらかといえばそう思わない・そう思わない)					
育ての	19	お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことがありますか。	(いいえ・はい)					
状況	20	現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。	(大変ゆとりがある・ややゆとりがある・普通・やや苦しい・ 大変苦しい)					
	21	気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。	(いいえ・はい)					
	22	物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。	(いいえ・はい)					
	23	あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。	(いいえ・はい)					
	24	あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。	(はい・いいえ)					
接予 種防	25	2か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。	(はい・いいえ)					
健康村	∄談€	的内容						
指導區	指導内容							
14 =								
特記	事項							

1か月児健康診査票

受診日 令		日				
身体測定	(生後 ()日) 身長					
	ЯK	cm g (増加量 g/E		cm	母乳・混合・人工乳	
診察所見	1 身体的発育異常 2 外表奇形 3 姿勢の異常 4 皮膚 5 頭部 6 顔 7 頚 胸部 1 実 異紹介(要精密・要) 4 要紹介(要精密・要) 4 要紹介(要精密・要) 2 既医 4 要紹介(要精密・要)	眼 ウロ:ロ エ耳:ハ ア 斜頚 イその他 ア 胸部の イ 呼吸の ウ 心 整脈 療 3 要経過観察 台療)	展常 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	(ア、またに 13 その他の 14 新生児聴	異常 関節形成不全リスク因子 はイからオの2項目以上) 異常 覚検査 謝異常等検査の結果説明	ア 臍: 肉芽・ヘルニアイ 腹部腫瘤 ウ そけいヘルニア エ 仙枝の運動制限 イ 内反足 ア モルー反射 イ 筋ト一ヌス ア 股股が発力 イ 大家族歴 エ 女児 オ 骨盤位分娩 正常・精査中(右・左)・未済・未 できている・できていない
育児環境等	F 母の/ イ その(
心配事	無•有(_)	
栄養	良•要指導	争				
1 特に問題	の必要性の判定 昼なし 2 保健師による ひ支援が必要(支援が必要)	
記事(要紹)	介となった場合の結果等)					

1か月児及び5歳児健康診査支援事業について(こども家庭庁)を抜粋して作成 https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/

都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性

課題	方向性
健診の実施場所	妊婦・乳児健康診査と同様に以下を対象 ・公益社団法人東京都医師会に加入する医療機関 ・東京都医師会に加盟しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を 掲げる医療機関
健康診査の内容	・国が要綱で示す健康診査の内容やマニュアルを基準に、先行実施している自治 体の事例も参考に検討(資料4-2、参考資料1、2)
公費負担額 (受診費用)・ 回数	・国の補助単価(6,000円・1回)を基準とする(資料3-1参照)
区市町村、1か月児健康診査 実施医療機関等との連携	・乳児健康診査を参考に検討(資料4-2)
その他の事務の流れ	・ 妊婦・乳児健康診査と同様 とする(資料3-3参照)



今後、課題と方向性について、詳細を検討していく

1か月児及び5歳児健康診査支援事業

第1 総則的事項

1 事業目的

乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において1歳6か月児及び3歳児に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、3から6か月頃及び9から11か月頃の健康診査についても、多くの自治体で実施されている状況となっている。こうした中で、新たに1か月児及び5歳児に対する健康診査の費用を助成することにより、出生後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備する。

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。

3 健康診査の種類

健康診査の種類は、1か月児健康診査及び5歳児健康診査とする。

4 その他

この実施要綱に定める事項以外の事項については、「乳幼児に対する健康診査の実施について」(平成10年4月8日児発第285号厚生省児童家庭局長通知)の第1に定める総則的事項を参照すること。

第2 各論的事項

- 1 1か月児健康診査
 - (1)目的

早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在 化する時期である1か月児に対して健康診査を行い、疾病及び異常を早期に発見し、 適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、 養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ること を目的とする。

(2) 健康診査の種類

健康診査の種類は、一般健康診査(原則、1か月児健康診査を実施する医療機関 (以下「実施機関」という。)に委託して行う個別健康診査)とする。

(3) 健康診査を実施する担当者

十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することとする。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して実施することは差し支えない。

(4) 実施対象者

一般健康診査の対象者は、標準的には、出生後27日を超え、生後6週に達しない 乳児とする。

- (5)項目等
 - 一般健康診査の項目は以下のとおりとする。
 - ① 身体発育状況
 - ② 栄養状態
 - ③ 疾病及び異常の有無
 - ④ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

- ⑤ ビタミン K₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
- ⑥ 育児上問題となる事項

(6) 留意事項

- ア 1か月児健康診査の結果を実施機関から市町村に速やかに報告されるよう連携体制を整備するなど、実施機関との連携を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより出産・子育て応援交付金による伴走型相談支援事業の効果的な実施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、こども家庭センターなどの関係機関とも連携しながら、必要な支援体制の整備を行うこと。実施機関において実施対象者が未受診であることを把握した場合は、速やかに市町村の担当窓口に情報共有することが望ましい。
- イ 本事業の実施対象者が居住地以外の実施機関において1か月児健康診査を受診する場合等、1か月児健康診査を実施機関に委託して行うことが困難な場合については、1か月児健康診査の結果が市町村へ速やかに報告されるよう実施機関と連携する場合に限り、1か月児健康診査にかかる費用を実施対象者へ直接助成することを認める。
- ウ 1 か月児健康診査の実施に当たっては、別に示す1 か月児健康診査の問診票及 び健康診査票を参考とすること。

2 5歳児健康診査

(1)目的

幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(2)健康診査の種類

健康診査の種類は、一般健康診査(原則、市町村保健センター等において行う集団健康診査)とする。

- 一般健康診査は、(5)の項目等の確認に加え、必要な児・保護者に対して多職種による専門相談及び健診後カンファレンスを実施すること。
 - ※ 巡回方式や園医方式を組み合わせて実施する場合を含む。なお、その場合であっても、必要な児・保護者に専門相談を提供するとともに、対象となる年齢の幼児全てに健康診査を実施できるよう工夫すること。
- (3) 健康診査を実施する担当者

十分な経験を有し、幼児の保健医療に習熟した医師、保健師、管理栄養士、心理相談を担当する者等により実施すること。

(4) 実施対象者

一般健康診査の対象者は、実施年度に満5歳になる幼児とする。標準的には、4歳6か月から5歳6か月となる幼児を対象とする。

(5)項目等

一般健康診査の項目は以下のとおりとする。

- ① 身体発育状况
- ② 栄養状態
- ③ 精神発達の状況
- ④ 言語障害の有無
- ⑤ 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

- ⑥ その他の疾病及び異常の有無
- (6) 留意事項
 - ア 健康診査に際して行われる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。 健康診査の結果、発達障害等(発達障害等の疑いを含む。)と判定された幼児

について、就学前までに必要な支援につなげることができるよう、関係部局や都 道府県等とも協力しながら、地域における必要な支援体制の整備を行うこと。

イ 5歳児健康診査の実施に当たっては、別に示す5歳児健康診査の問診票及び健康診査票並びにこども家庭科学研究の研究班により作成された5歳児健康診査マニュアルを参考とすること。

別 表

【一部改正】母子保健衛生費の国庫補助について 改正後全文(こども家庭庁) (https://www.ofa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2024/) を一部抜粋して作成



令和6年度 こども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業

こどもの健やかな成長・発達のためのバイオサイコソーシャルの観点 (身体的・精神的・社会的な観点)からの切れ目のない支援の推進のための研究(研究代表者 永光信一郎)

研究協力機関:日本小児科医会 日本産婦人科医会 日本小児科学会 日本産科婦人科学会 日本新生児成育医学会

目次

第1	部	1 か	月児健康診査の目的・意義・実施体制・実際・判定	3
第	1章	1	か月児健康診査の目的と意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	第1	節	目的 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
	第2	節	意義	4
第	2章	1	か月児健康診査実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	第1	節	健診の実施時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	第2		健診の実施方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
		(1) 健診を実施する担当者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
) 健診の種類と必要な連携体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
		(3) 問診票 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
		(4) 健康診査票 (健診票)	7
	第3	節	自治体の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
第	3章	1	か月児健康診査の実際・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第1	節	問診項目とその解釈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	第2	節	身体測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	第3	節	診察	13
	第4	節	判定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
		(1) 医師の所見による判定	22
		(2)子育て支援の必要性の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
第2	部	1 か	月児健康診査時に注意すべき項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
第	1章		康を決定する社会的要因(Social determinants of health:SDH)の評価	
	第1	節	親子関係の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	第2	節	両親と家族の健康評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	第3	節		24
	第4	節	事故予防の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	第5	節	その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
第	2章	栄	養	25
笙	3 賁	目	・	97

第4章 睡眠衛生指導	29
第5章 新生児期に認められる疾患・・・・・・・・	30
第6章 1か月児健康診査の留意事項	32
第1節 1か月児健診を起点とする子育て支	援32
第2節 虐待の可能性が疑われた場合・・・・・	33
第3節 予防接種のスケジュール説明・・・・・	34
第7章 1か月児健康診査時の保護者の心理的	支援 · · · · · · · · · · 3 5
第1節 保護者の心理的状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3E
第2節 心理的アセスメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
第3節 心理的支援方法	
第8章 1か月児健康診査で保護者から寄せられ	れる質問 · · · · · · · · · 38
第9章 その他	43
第1節 早産・低出生体重で生まれた児・保	護者への配慮・・・・・・・・・ 43
第2節 子ども医療電話相談事業 (#8000)	の案内····· 48
第 10 章 チェックリスト	45
参考文献 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47
執筆者·研究協力者·研究協力機関 一覧	51
¥4. →- ½∞ ¼c1	F

第1部 1か月児健康診査の目的・意義・実施体制・実際・判定

第1章 1か月児健康診査の目的と意義

第1節 目的

母子保健法の第一条には「この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする」と記されており、健康診査(以下「健診」という。)は乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るために講じる措置の一つとなります。

1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)は、「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和5年12月28日付けこ成母第375号こども家庭庁成育局長通知。以下「通知」という。)に記されているとおり、「早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して健康診査を行い、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ること」を目的としています。

また、通知で挙げられているように、1か月児健診で行う具体的項目として、以下の6つがあります。

- ① 身体発育状況
- ② 栄養状態
- ③ 疾病及び異常の有無
- ④ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
- ⑤ ビタミン K₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
- ⑥ 育児上問題となる事項

健診を実施する医師は、1か月児の身体発育状況、栄養状態、健康状態の評価を行い、身体異常の早期発見に努め、異常を認めた場合や疑われた場合は遅滞なく専門医療機関への紹介に努めてください。さらに健康を決定する社会的要因を評価し、支援が必要な場合には自治体の担当窓口に報告するとともに、必要に応じて自治体の担当窓口と連携を図りながら、かかりつけ医等での継続的な支援を実施します。乳幼児健診が未受診であることを把握した場合は、速やかに自治体の担当窓口に情報共有すること、虐待の可能性が疑われた場合は、速やかにこども家庭センター等の自治体の担当窓口または児童相談所に通告を実施してください。

第2節 意義

出生時から生後1か月は、多種多様な先天性疾患が顕在化する時期であり、早期介入が生命予後やQuality of Life を規定する重要な時期です。新生児期早期に発症する疾患は胎児期や出生後すぐに医療機関にて認知され、専門医療機関への紹介、速やかな治療へと進める体制が多くの地域で整備されています。一方で、出生時には症状を認めないが、生後1か月程度で症状が出現する生命にかかわる重篤な疾患(先天性心疾患、代謝疾患、胆道閉鎖症等)も少なくありません。また、発育性股関節形成不全等の早期発見により侵襲的処置を回避できる疾患もあります。このように、乳児の身体所見取得に習熟した医師による1か月児健診により、疾患の早期発見・早期治療によって児の予後を改善することができると考えられます。また、これらの疾患の発見において重要な時期に、医療機関と自治体が情報を共有することで必要な支援につながることが期待されます。

保護者に対する様々なサポートも重要な課題です。Tokumitsuらの報告によると、母親の産後うつの発生頻度は 14%前後と推定され、産後 2 週間をピークに 3 か月までに発症します 11 。 さらに父親の産後うつの発生も 3 $^{\sim}$ 6 か月をピークに同水準と報告されています 21 。 父親の育児休業取得率は上昇していますが、令和 5 年度の男性の平均育休期間は 46.5 日(速報値)であり、復職前に男性に対して育児支援を実施する必要性があると考えられています 31 。 大阪府における子ども医療電話相談事業(#8000)の集計報告では、#8000 に問い合わせのあった項目として "嘔吐"、"泣きやまない"、"育児相談"は、生後 1 か月以内が多く 41 、この時期において対面での育児相談の機会を充実させる必要性を如実に示しています。乳児期早期の健診は、保護者に対する相談支援の機会となることから、こども家庭センター等とも連携することにより、安心して子育てが出来る環境整備につなげていくことが期待されます。また、新生児マススクリーニングにより、早期に治療可能な疾患が発見されるようになったため、適切なタイミングで情報提供や相談支援を行うことが重要です。更に、生後2 か月から開始される予防接種について啓発し、接種をスムーズに進める事も重要となります。

第2章 1か月児健康診査実施体制

第1節 健診の実施時期

1か月児健診の対象者は、標準的には、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児です。

上記期間を設定した根拠として、当該時期は出生直後には診断することが困難な身体疾患(心疾患、代謝疾患、神経筋疾患、胆道閉鎖症、幽門狭窄症、発育性股関節形成不全、難聴等)の臨床症状が出現する時期です。乳児の身体診断に習熟した医師が健診を実施することによって早期発見・早期治療による疾病予後改善が見込まれます。また、新生児・乳児ビ

タミン K 欠乏性出血症予防のためのビタミン K_2 シロップの投与や、新生児マススクリーニング検査に対する適切なフォローアップに対応できる体制が求められます。生後 1 か月までは、軽微な症状(鼻閉音、微熱、吐乳・溢乳、泣きやまない)に対して不安をもつ保護者が多く、医師等の医療従事者と対面で育児についても相談する機会を設けることが望まれます。また、生後 2 か月から始まる予防接種のスケジュールについても、医師と相談できることが望ましいです。日本のこどもの貧困率は 11.5% (2023 年度数値)であり 5 、経済格差は養育困難(不全)の一因になります。各家庭/こどもにおける健康を決定する社会的要因を早期に評価をしておくことは地域で養育支援を行ううえで重要と考えられます。さらに産後から生後数か月までは母親・父親とも産後うつが発生しやすい時期なので、必要な相談支援につなげることが必要です。また、こども虐待への対応は喫緊の課題です。0 歳児の心中以外の虐待死のうち 68.0%は生後 1 か月以内に死亡し、心中以外の虐待死のうち、3 ~4 か月児健診の未受診者は 18.9% (有効割合)であり 5 、生後 1 か月に健診を拡充することにより、未受診等の虐待リスクの早期発見に寄与することが期待されます。

第2節 健診の実施方法

(1) 健診を実施する担当者

十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することになります。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して実施することは差し支えありません。

(2) 健診の種類と必要な連携体制

健診の種類は、原則として医療機関に委託して行う個別健診です。医療機関において実施された健診の情報については、健診情報を自治体にすみやかに提供することで、同時並行して行われている関連行政施策(新生児訪問指導*、乳児家庭全戸訪問事業*や伴走型相談支援*)との情報統合や、それらの施策で実施される保健指導などに活用されるなど、必要な連携体制を構築することが期待されます。

*新生児訪問指導

母子保健法第 11 条に定められた事業で、育児上必要があると認めるときに、保健師や助産 師等が訪問し、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等に関し必要な指導を行う事業

*乳児家庭全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業)

生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、育児に関する相談や情報提供を行い、親子の状況を把握して必要な支援につなげる事業

*伴走型相談支援

市区町村が、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、 出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報提供等を行うことを通じて必要 なサービスに繋ぐ支援

(3) 問診票

1か月児健診を実施する医師及び助産師、看護師が、1か月児健診の目的に記されている 内容を網羅的にスクリーニングできる質問項目を問診票として設定しています(図1)。質 問項目は、出生時の状態、器質的疾患の確認、発達、親(主な養育者)や子育ての状況、予 防接種についてです。問診票の記載内容を診察の前に、保健医療に習熟した助産師、看護師 又は医師による確認を行い乳児の健康状態、身体疾患の早期発見、健康を決定する社会的要 因の評価、育児相談の必要性など評価を行います。各々の問診項目の内容と解説の詳細は、 「第3章1か月児健康診査の実際 第1節問診項目とその解釈」に記載しています。

図1 1か月児健康診査問診票(拡大版:巻末資料54ページ参照)

の出 状生 態時				
銀糖		在胎週数 ()週		
165 . 1		出生時体重()g		
器質的疾患の	1	お乳をよく飲みますか。	(はい・いいえ)	
	2	元気な声で泣きますか。	(はい・いいえ)	
	3	大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。	(はい・いいえ)	
	4	お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。	(いいえ・はい)	
確認	5	からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。	(いいえ・はい)	
88	6	うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便(便色カード1番から3番)が続いていますか。	(いいえ・はい)	
発達	7	あなたの顔をじっとみつめることがありますか。	(はい・いいえ)	
	8	裸にすると手足をよく動かしますか。	(はい・いいえ)	
	9	現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	(なし・あり(1日_本))	
	10	現在、お子さんのお父さん(パートナー)は喫煙をしていますか。	(なし・あり(1日_本))	
	11	窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。	(はい・いいえ)	
親	12	ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか。	(はい・いいえ)	
÷	13	あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)	
エな	14	赤ちゃんをいとおしいと感じますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)	
養	15	子育てについて不安や困難を感じることはありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)	
育	16	子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。	(はい・いいえ)	
者	17	(きょうだいがいらっしゃる方へ)きょうだいのことで相談したいことはありますか。	(いいえ・はい)	
)や子育ての		お子さんのお母さんとお父さん(パートナー)は、協力し合って家事・育児をしていますか。	(そう思う・どちらかといえばそう思う・ どちらかといえばそう思わない・そう思わない)	
	19	お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことが ありますか。	(いいえ・はい)	
の状況	20	現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。	(大変ゆとりがある・ややゆとりがある・普通・やや苦しい・ 大変苦しい)	
	21	気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。	(いいえ・はい)	
	22	物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。	(いいえ・はい)	
	23	あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。	(いいえ・はい)	
	24	あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。	(はい・いいえ)	
接予 種防		2か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。	(はい・いいえ)	
		D内容		
指導区	内容			
特記	事項			

出典: こども家庭庁 母子保健の主な動き (通知・事務連絡等) 2023 年 1 か月児及び 5 歳児健康診査支援事業について https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/ (2024.10.11 アクセス)

(4)健康診査票(健診票)

問診票から抽出された情報や、身体測定(第3章第2節に記載)、診察(第3章第3節に記載)から得られた所見を、健診票(図2)に記入します。身体測定については、身長、体重(及び1日の増加量)、頭囲に加え、栄養法(母乳・人工乳・混合)を記載します。診察所見については、1身体的発育異常、2外表奇形、3姿勢の異常、4皮膚、5頭部、6顔、7頚部、8胸部、9腹部・腰背部、10四肢、11神経学的異常、12発育性股関節形成不全リスク因子、13 その他の異常の有無を確認し、異常があれば、所見を健診票に記載します。14新生児聴覚検査の確認を行い、母子健康手帳などを通じて、「リファー」と示された場合は、専門医によるより詳しい精査を受けているかを確認します。15先天性代謝異常等検査の結果説明を行い、16便色カードで便色番号を確認し、17ビタミン K2の投与ができているかを確認します。14から17についてはそれぞれの結果を健診票に記載します。診察医による判定を記載します(第3章第4節(1)に判定の基準を記しています)。

1か月児健診では、母親等の健康状態や育児環境についての配慮が重要です。問診票から 抽出された情報や診察時の会話や表情や仕草(抱き方、診察台への寝かせ方など)から、母 親等の心身の健康状態を含む育児環境や、保護者の心配事、母親の栄養状態なども、医師ま たは助産師・看護師によって評価され、その判定を健診票の子育て支援の必要性の判定に記 載します。(第3章第4節(2)に判定の基準を記しています)

受診日 令和 年 |身体測定(生後(身長 栄養法 母乳·混合·人工乳 g(增加量 pm·腰背部 臍:肉芽・ヘルニア 腹部腫瘤 そけいヘルニア 仙骨部の異常 四肢の運動制限 身体的発育異常 - min 発育 2 外表奇形 3 姿勢の異常 4 皮膚 アイウ 長頭腫 常 エアイウ モ頭頭 10 四時 内反足 モロー反射 11 神経学的異常 5 頭部 では 筋トーヌス 股関節開排制限 大腿/そけい皮膚溝の非対称 家族歴 與血腫 頭囲拡大 小頭症 終 等異的 類貌 12 発育性股関節形成不全リスク因子 (ア、またはイからオの2項目以上) 工 総合異常 ア 特異的顕貌 イ 目:白色瞳孔、角膜混濁・ 眼瞼の異常等 ウロ:口唇裂 口蓋裂 エ耳・小耳症・副耳・耳瘻孔等 ア 斜顕 6 顔 女児 骨盤位分娩 13 その他の異常 7 頚部 ア 料鎖 イ その他の頚部腫瘤 ア 胸部の異常 イ 呼吸の異常 ウ 心雑音 エ 不整脈 正常 精査中(右 左) 未 済 未 8 胸部 14 新生児聴覚検査 15 先天性代謝異常等検査の結果説明 16 便色カード 17 ピタミンK₂の投与 番 できている · できていない 1 異常なし 2 既医療 3 要経過観察 4 要紹介(要精密・要治療) 紹介先 診査医名 育児環境等 母の心身状態 イ その他 無-有(心配事 栄養 良-要指達 子育て支援の必要性の判定 1 特に問題なし 2 保健師による支援が必要 3 その他の支援が必要(判定者 記事(要紹介となった場合の結果等)

図2 1か月児健康診査票(拡大版:巻末資料55ページ参照)

出典: こども家庭庁 母子保健の主な動き (通知・事務連絡等) 2023 年 1 か月児及び 5 歳児健康診査支援事業について https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/ (2024, 10, 11 アクセス)

第3節 自治体の役割

通知の趣旨は、近年の超少子化、核家族化(世帯分離)、女性の社会進出等に伴い、こどもが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進を図ることであり、その中心的役割を担う母子保健医療対策の充実強化が明示されています。 1 か月児健診支援事業における自治体の留意事項としては、1 か月児健診の結果を実施機関から自治体に速やかに報告できるように実施機関との連携をより密接に行うとともに、健診の結果等の情報を正確にまた速やかに整理して必要な支援につなぐための面談を実施する伴走型相談支援の効果的な実施につなげることが求められています。また、1 か月児健診の実施が虐待の予防及び早期発見に資することに留意し、こども家庭センター等の関係機関とも連携しながら、必要な支援体制を拡充することも使命の1つです。実施機関において実施対象者が未受診であることを把握した場合は、速やかに自治体の担当窓口に情報共有されるような体制づくりが求められています。

第3章 1か月児健康診査の実際

第1節 問診項目とその解釈

- 1. お乳をよく飲みますか。
- 2. 元気な声で泣きますか。

分娩施設から退院した後もしっかり哺乳出来ているか、元気に過ごしているかを確認します。これらの項目に問題がなくても、体重増加不良がある場合は、具体的な哺乳状態や赤ちゃんの全身状態の確認が必要です。また、分娩施設退院時はこれらの項目に問題がなくても、心疾患や代謝性疾患などでは徐々に哺乳力が低下し、活気不良となることもあります。順調に哺乳量が増えているかも確認しましょう。

- 3. 大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。 聴力についての項目です。この項目と同時に、分娩施設退院時の新生児聴覚検査結果も確認しましょう。
- 4. お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。

チアノーゼについての項目です。健診時安静にしているとチアノーゼは見られなくても、哺乳や啼泣など酸素需要量が増えるとチアノーゼが見られる場合があります。心疾患や気道に問題がある場合がありますので専門医への紹介を検討しましょう。

5. からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。 筋緊張についての項目です。正常では仰臥位で四肢半屈曲、または上肢半伸展し下肢半屈 曲、手はゆるく握っている状態です。後弓反張や蛙肢位(仰臥位で四肢を床にべったりつける肢位)、手を強く握ったまま母指を握り込んでいる状態は神経学的異常の所見です。

6. うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便(便色カード1番から3番)が続いていますか。

胆道閉鎖症についての項目です。便色カードを見て確認したり、場合によっては浣腸などにより便の色を確認したりした方がよい場合もあります。さらに、尿の色が濃い黄色から茶褐色に変化するのも重要なサインと考えられます。 1 か月児健診時は皮膚の黄染の程度からは黄疸を判断するのは難しく、経皮黄疸計は血中ビリルビン値と相関していないこともあります。胆道閉鎖症を疑うときは血液検査を行いましょう。また、血液検査が難しい場合は、すみやかに専門医に紹介しましょう。

7. あなたの顔をじっとみつめることがありますか。

視力についての項目です。1か月児はまだ、ぼんやりとしか見えていませんが、愛着形成のため、哺乳時や抱っこしているときに赤ちゃんとしっかり目を合わせるように指導しましょう。なお、瞳が白く見えるなど、目について気になることはないか、確認しましょう。

8. 裸にすると手足をよく動かしますか。

裸にされた赤ちゃんはランダムに四肢をよく動かします。足の力だけで移動できる赤ちゃんもいます。左右で常に同じ動きをしていたり、動きの大きさに左右差があったりする場合は異常所見の可能性もあります。診察時に眠っており全く動かない場合は日頃の様子も尋ねて総合的に評価しましょう。

- 9. 現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。
- 10. 現在、お子さんのお父さん (パートナー) は喫煙をしていますか。

両親の喫煙についての項目です。母親の喫煙により母乳にもニコチンなどの有害物質が含まれます。また、母親だけでなく赤ちゃんの周囲にいる人が喫煙すると、有害物質が衣服や髪に付着したり、呼気に含まれたりして赤ちゃんに影響を及ぼすと言われています。また、両親の喫煙により、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクは高くなるとも言われています。家族ぐるみで禁煙することを勧めましょう。

11. 窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。

事故防止の知識について確認する項目です。乳幼児突然死症候群 (SIDS) のリスクを軽減するため仰向けに寝かせる、窒息予防のためまわりに柔らかい寝具を置かないなど赤ちゃんの過ごす環境について確認しましょう。

12. ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか。

1か月未満の乳児でも、反り返りなどでベッドから転落することがあります。転落する可能性のある高いところには寝かせないようにすることなどを説明しましょう。また、足の力だけで移動し狭い隙間に挟まってしまうことがあります。日頃から隙間のある家具や危険な物(たとえばはさみなど)が周囲にないか確認するように指導しましょう。

- 13. あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。
- 14. 赤ちゃんをいとおしいと感じますか。

赤ちゃんへの愛着形成についての項目です。「はい」の回答が期待されます。それ以外の回答でも保護者の回答に共感し、丁寧に理由や状況を聞きます。常に追い詰められた気分で育児を行っているとすれば、愛着形成は困難です。育児不安や産後うつなどから、あるいは児側の問題から愛着形成が不十分になり、ネグレクトなど児童虐待につながることもあります。家族や第三者が話を充分に聞くことで保護者の精神的安定が図られ、愛着形成の支援になります。継続した支援が必要な場合はこども家庭センター等と連携を図るとよいでしょう。

- 15. 子育てについて不安や困難を感じることはありますか。
- 16. 子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。

分娩施設退院後の子育てについての不安や困難についての項目です。分娩施設退院後赤ちゃんの成長に伴い新たな不安や困難も出てくるでしょう。疾患として医学的介入が必要なこと以外にも、不安や困難についてしっかり聞きましょう。話を聞くだけで保護者のサポートになることもあります。状況により、生後2か月から、予防接種の機会にも相談できることを伝えるとよいでしょう。

- 17. (きょうだいがいらっしゃる方へ) きょうだいのことで相談したいことはありますか。 1 か月児健診はきょうだいの成長発達について相談するよい機会です。きょうだいについての相談があるかも確認し、必要があれば適切な医療機関等につなげる必要があります。また、児のきょうだいがいわゆる「赤ちゃんがえり」を示すときは「環境の変化や子ども自身の成長による言動である」と理解し、きょうだい児との2人の時間を作るなど、その気持ちを汲んだ対応ができるようアドバイスします。きょうだい児の年齢によっては、赤ちゃんのお世話を一緒にするなども考えられます。また、2人目出産後、2人の育児に悩む保護者も多く、保護者の話に傾聴しましょう。
- 18. お子さんのお母さんとお父さん(パートナー)は、協力し合って家事・育児をしていますか。 父親(パートナー)が家事・育児をすることは母親の心身の負担や不安を軽減する効果も 大きく、父子関係の構築にも重要であるため、夫婦でよく話し合い、共に子育てに関わるこ

とができるように声をかけましょう。子育てという新たな環境や役割の変化により、保護者 は心身の状態を崩しやすい時期です。母親だけでなく父親(パートナー)も「支援される対 象」であることに留意する必要があります。

19. お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことがありますか。

「赤ちゃんは泣くのが仕事」といいますが、分娩施設を退院するとよく泣くようになります。まずは哺乳量の不足がないか、哺乳状態について確認します。空腹と関係がないようであれば抱っこの方法を工夫してみたり、少し外気浴をしてみたり、赤ちゃんと共に気分を変えるための環境の工夫をすることもよいでしょう。また、いらいらしてしまう時は、赤ちゃんをいったん安全なところに寝かせた上でその場を離れたりするなど、いらいらする気持ちを赤ちゃんにぶつけてしまわないようにどうすればいいかお話しします。泣きへの対処方法についてあらかじめ話をし、イメージをふくらませておくことは重要です。乳幼児揺さぶられ症候群の予防にもつながります。

20. 現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。

赤ちゃんを取り巻く経済状況についての項目です。この項目に問題がなくても、赤ちゃんの着衣やおむつ、皮膚の状態などから総合的に判断します。また、健診に付き添っている家族の様子も参考になることがあります。必要があればこども家庭センター等の適切な支援につなげる必要があります。

- 21. 気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。
- 22. 物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 母親のメンタルヘルスについての項目です。身体的にも精神的にも不安定で、育児不安が 高まる時期です。母親の精神的不調を早期に発見し育児支援を行うことで母親の精神的安 定が図られ、愛着形成支援だけでなく児童虐待予防にもつながります。エジンバラ産後うつ 病自己評価票を活用するのもよい方法です。また、産後2週間、1か月時の産婦健診の結果
- 23. あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。

についても確認をしましょう。

睡眠が十分に取れていると感じる場合はよいですが、眠れないとの訴えがある場合はその状況を聞き取り、慎重に対応することが必要です。まずは保護者が眠る時間を確保できるように、周囲の協力を得ることを勧めてください。眠れない以外に、上記 21 や 22 の質問に「はい」と回答している場合は周産期うつ病の可能性もあります。休息を取るようにこころがけても症状が改善しない場合あるいは、十分に休息が取れない状況が続き辛い場合は、こども家庭センターに支援の依頼や精神科への紹介が必要になります。

24. あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。

保護者の休息についての項目です。赤ちゃんの睡眠リズムは1か月時にはまだ確立していないことが多く、赤ちゃんが寝ているときは保護者も一緒に休むことを勧めます。また、家事・育児を周囲にお願いし、ご自身の時間をもつことも大切です。産後1か月では体調が不安定な時期が続いているので、しっかり休息をとるように勧めてください。

25. 2か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。

生後2か月からの予防接種について確認する項目です。国の予防接種実施要領においては、生後2か月からが標準的な接種期間となるワクチンが複数あります(5種混合、小児用肺炎球菌、ロタウイルス、B型肝炎)。ワクチン接種予定日を伝え、それまでにワクチンについての説明文書を読んでもらいましょう。

第2節 身体測定

身長

平坦な台板に児を仰臥位に寝かせ、児の頭頂部を固定板につけ、耳眼面(眼窩点と耳珠点とがつくる平面)が台板と垂直になるように頭部を固定し、足底も台板と垂直になるようにして、1mm単位まで計測します(図3)。乳児期の身長計測は誤差を生じやすいので、測定時にはきちんと膝を伸展させ、身体をまっすぐに固定します。計測値は、もれなく母子健康手帳、健診票に記載します。




図3 新生児・乳児の身体測定

体重

体重の推移を評価するためには、感度が 10g 単位以内の体重計の使用が望ましく、全裸で 計測します。授乳直後の計測はさけるようにします。

頭囲

仰臥位で計測します。外後頭隆起から左右の眉間の直上を通る周囲長を $1\,\mathrm{mm}$ 単位まで計測します 7 。

栄養法

栄養法(母乳、人工乳、混合)を確認します。

母乳栄養の場合には、授乳回数、授乳のタイミング、授乳1回あたりにかかる時間を確認します。混合・人工栄養の場合には、1回あたりの人工乳の量と授乳回数を確認します。また、排便の回数や性状などを確認します。

計測の評価と対応

体重増加の評価

出生体重からでなく、退院時の体重(または最低体重)から、1日あたりの体重増加を計算します。

※新生児の体重増加については以下の通り 7,8)

生後5~10%の生理的体重減少

生後4日頃から体重は増加しはじめる

生後2~3週までに出生体重に戻る

退院後の体重増加は1日25g以上が望ましい

体重増加不良の場合

体重増加不良の主な原因は、不適切な授乳による栄養摂取不足です。その他、低出生体重児、基礎疾患、ネグレクトなどが原因となることがあります。適切な栄養摂取により体重が増加に転じることが多いので、授乳の状況の確認、母親へのエモーショナルサポートが重要です。

混合・人工栄養では、不適切な調乳温度・濃度が、哺乳量の低下や下痢につながっていることがあります。調乳の詳細な状況についても確認することが必要です。

明らかな異常がないのにゆっくり体重が増える(slow weight gain)児もいます。体重測定を定期的(当初は $1\sim2$ 週毎)に行い、児の活気や筋緊張、ツルゴール、排尿や排便の状況、授乳の状況などから、総合的に異常がないかを判断します。

基礎疾患など児自身の要因による哺乳困難が疑われる場合には、原因の検索を早急に進めるようにします。

第3節 診察

1. 身体的発育異常

Point!

- ① 体重増加は分娩施設退院時からの増加率で評価します。
- ② 頭囲の大きさに加え、体幹や四肢のバランスの評価も重要です。

出生時の在胎週数、初産/経産の別、計測値(身長、体重、頭囲、胸囲)、在胎期間と比べた体格(SGA(small for gestational age newborns)等)を確認し、1か月児健診の測定値(身長・体重・頭囲)を乳幼児身体発育曲線(2010年版)にプロットし、正常範囲(3~97

パーセンタイル)に入っているかを評価します $^{9\sim11)}$ 。早産・低出生体重児で生まれた児については、低出生体重児用の身体発育曲線を用いて評価します(第9章第1節参照)。

体重増加は退院時(または2週間健診時)からの1日当たりの増加率で評価され、20-50g/日が標準となります。体重増加不良を認めた場合、哺乳量の問題なのか、哺乳力が弱いのか、その他の原因なのかを検討します。25g/日未満の場合はその後のフォローアップが必要です。 頭囲の異常が無いか、頭部と体幹や四肢のバランスも確認します。

2. 外表奇形 (形態異常)

Point!

- ① 着衣を外して全身を観察します。
- ② 外表奇形(形態異常)を疑う場合には専門施設に紹介します。

大きな外表奇形 (形態異常) は出生時に指摘されていることが多いですが、退院後に明らかになってくる異常所見もあります。着衣を外して、頭部、体幹、四肢のバランスを確認し、さらに、頭部、顔面、眼、鼻、耳、口、頚部、上肢、下肢、臍部、外性器、腰背部、臀部、咽頭・口腔内など、系統的に全身の診察を行いながら、外表奇形 (形態異常) の有無を確認します。

診察は可能な限り児が安静にしている状態で行い、保温、感染予防にも留意します。

3. 姿勢の異常

Point!

① 仰臥位で姿勢、四肢の動きを確認します。

仰臥位では、上下肢は軽く屈曲して自由に動かし、手指は半ば開くか軽く握る状態となります。 頚部は左右どちらかを向くことが多く、時に向きを変えることが出来ます。

明らかな反り返り(後弓反張)や下肢の伸展位は筋緊張亢進の所見です。四肢をだらりと 床面につけたままの姿勢(蛙肢位)の場合は筋緊張低下、フロッピーインファントが疑われ ます。

四肢の動きが極端に少ない、手足の動きに左右差がある場合は分娩麻痺や片麻痺が疑われます。

4. 皮膚

Point!

- ① チアノーゼを認めた場合には小児医療施設へ紹介します。
- ② 黄疸を認めた場合には閉塞性黄疸や母乳性黄疸等があることを認識します。

チアノーゼの有無は口唇、口腔粘膜、爪床および安静時の $\mathrm{Sp0_2}$ で確認します。 $\mathrm{Sp0_2}$ が 94% 以下の場合は緊急性のある徴候(第 2 部第 3 章 1. 緊急性のある徴候参照)です。 チアノーゼ性心疾患、呼吸器疾患を念頭に速やかに対応します。

間接ビリルビン優位の黄疸は明るい黄色の皮膚色となりますが、閉塞性黄疸では直接ビリルビン優位のくすんだ黄色調の皮膚色となります。高度の黄疸、閉塞性黄疸が疑われる場合には精密検査が必要になります。間接ビリルビン優位の黄疸としては、いわゆる母乳性黄疸の頻度が高いですが、他の原因や疾患を除外する必要があります。

血管腫のうち、眼瞼や前額部のサーモンパッチ、頭部やうなじのウンナ母斑、やや盛り上がった乳児血管腫(いちご状血管腫)は自然軽快が期待できます。ポートワイン母斑(単純性血管腫)、海綿状血管腫は専門医への紹介も考慮します。その他では、白斑、カフェオレ斑、頭部や前額部に好発する脂腺母斑をしばしば認めます。

皮膚炎の好発部位は顔面、頭部、腋窩、外陰部、臀部となり、認めた時はスキンケアを指導するとともに、症状が強い場合は外用薬の塗布が必要になります。

5. 頭部

Point!

- ① 乳幼児身体発育曲線にプロットして、頭囲の大きさ、変化を評価します。
- ② 頚部の後ろを支え、頭部を軽度挙上した姿勢で、頭部全体を診察します。

頭囲が97パーセンタイル以上が大頭、3パーセンタイル未満が小頭となります。変化をみることも重要で、乳幼児身体発育曲線にプロットして評価します。家族性の場合もありますが、乳幼児身体発育曲線にプロットして評価します。増悪傾向があったり、大泉門の異常や頭蓋骨縫合の異常を認めた場合は精密検査が必要になります。

頭部の診察は、後頭部と頚部の後ろを支えながら、頭部を軽度挙上した姿勢で行います。 頭血腫などの腫瘤の有無、大泉門の大きさや性状、頭蓋骨縫合の状態、頭蓋骨の硬さ、毛髪 の生え方、頭皮の異常所見の有無などをみます。頭血腫の吸収はその過程で一旦骨化し硬く なり1か月以上かかるのが普通です。頭部変形は向き癖による獲得性や一過性のものが多 く、頭蓋縫合早期癒合症(外科的治療が必要な場合があるもの)や病的なものは稀とされて います。

6. 顔

Point!

- ① 特徴的な顔貌を認めた場合には小児医療施設に紹介します。
- ② 目の診察では気になること、家族歴の聴取が大切で、眼瞼、眼球、結膜・角膜を確認します。

顔は先天異常が現れやすい部位であり、何か特徴的な顔貌(characteristic face, Odd looking)かどうか、奇形(形態異常)症候群などを疑わせる所見がないかを確認します。 眼の位置や形態、耳介変形や低位、小耳、副耳、耳瘻孔、口の形状などの所見が重要です。

目の診察に際しては、目に関する気になる症状や家族歴の有無を聴取します。眼瞼下垂等の眼瞼の異常がないかを診た後、可能な限り開瞼させて、眼球の異常の有無を確認します。 上体を起こし軽く腹臥位傾向で支え上体を揺すると開眼します。ペンライトを使用すると、 角膜の大きさや混濁、白色瞳孔等の有無を診察し易くなります。眼脂の有無、結膜所見も確認します。なお、固視や追視はみられず、眼球の共同運動は弱いため、斜視の診断は3か月頃まで困難です。

口腔内の診察は最後に行うようにし、咽頭から口蓋の所見、歯肉、舌の所見などを確認します。できるだけ口蓋垂まで確認します。軟口蓋裂や嚢腫、過剰歯、口腔カンジダ症などを認めることがあります。

口腔内の診察後には泣いてしまう児が多く、その泣き顔で左右差がある場合、顔面神経麻痺や口角下制筋形成不全が明らかになることもあります。

7. 頚部

Point!

① 仰臥位にして、頚部の傾きや腫瘤の有無を確認します。

仰臥位の状態で頚部の診察を行います。左右差の有無、腫瘤や瘻孔の有無を確認します。 胸鎖乳突筋に腫瘤を認めた場合、頚部の可動性や傾きも評価しますが、斜頚等の精密検査が 必要になることがあります。

また、頚部の皺の間は皮膚炎の好発部位で、多くは皮膚と皮膚の接触や乾燥不足で発生します。広げて乾燥させるようなスキンケアを指導するとともに、皮膚炎を認めた場合など症状が強い時は外用薬の塗布が必要になります。

8. 胸部

Point!

- ① 努力呼吸の有無を確認します。
- ② 胸部の聴診では心雑音の有無、心拍リズム、および喘鳴の有無を聴取します。

胸郭の形、努力呼吸(陥没呼吸、多呼吸等)の有無を診た後、聴診により、心音の速さ (心拍数)、リズム不整や心雑音の有無を確認します。心雑音としては生理的末梢性肺動脈 狭窄による駆出性雑音など無害性雑音が多いものの、心雑音の性状や部位、体重増加も含め た全身状態により精密検査を急ぐべきか判断します。 呼吸音の聴診では喘鳴やラ音の有無、左右差がないかを確認し、喘鳴を認めた場合は吸気性か呼気性かも評価します。強い吸気性喘鳴がある場合は気道狭窄が疑われ、ラ音や含気に左右差がある場合は、下気道感染症や無気肺等が疑われます。何れも精密検査が必要ですが、全身状態や努力呼吸の有無により、早急に対応すべきかどうかを判断します。

9. 腹部・腰背部

Point!

- ① 腹部膨満を認めたときは、排便の状況も確認します。
- ② 皮膚洞が臀裂より上にあったり、腫瘤や血管腫を伴った場合は専門施設に紹介します。

視診で腹部膨満や皮膚の光沢・色調を、触診で緊満感や肝脾腫、腫瘤の有無を、聴診で腸音、異常血管音の有無を確認します。腹部膨満を認めた場合は便の性状や回数、肛門の形状や位置も確認します。腹部触診は嘔吐を誘発しやすいため、注意して行います。

臍部では、臍ヘルニア、臍肉芽腫、臍膿漏や臍炎をしばしば認めます。臍ヘルニアは自然 治癒も期待できますが、大きなものでは綿球圧迫法が試みられることがあります。臍肉芽腫 は消毒に加え、ステロイド外用薬の塗布や硝酸銀による焼灼、大きい場合は結紮を要する場 合もあります。

そけい部に腫大、腫瘤を認めた場合、そけいヘルニアが疑われます。外陰部や外性器の診察では、男児では陰嚢水腫、停留精巣、尿道下裂を、女児では陰核肥大、陰唇癒合、高度の色素沈着の有無を確認します。

背部の診察は腹臥位で行い、皮膚所見、側弯の有無などを評価します。臀部では、おむつかぶれなどの皮膚炎の有無、臀部の形状、毛巣洞(先天性皮膚洞)などの有無を確認します。 毛巣洞は臀裂内の正中部に存在することが多く、一般的にはくぼみの底の部分も確認できます。一方、くぼみが臀裂より上に存在するもの、毛が生えているもの、脂肪腫や血管腫を合併する場合は二分脊椎を合併している可能性があり、脳神経外科と小児科のある専門施設で精密検査を行う必要があります(紹介先は施設毎に要確認)。

10. 四肢

Point!

① 上下肢の形態や動きの異常を疑う場合には小児医療施設に紹介します。

上下肢とも、太さや長さ、皮膚色の左右差の有無、頭部や体幹とのバランスなどを確認します。極端な左右差がある場合、精密検査が必要です。四肢の長さが頭部、体幹に比べて短い場合は骨系統疾患等が疑われます。

手掌から指の診察では、手掌、手背の両面を診察します。手指は軽く握っていることが多いですが、可能な限り、指・趾を開かせて、動きや形態異常の有無を確認します。

上肢の動きに左右差がある場合、分娩麻痺や鎖骨骨折を疑います。C5~C7傷害のErb麻痺では上肢挙上が、C8~T1傷害のKlumpke麻痺では把握が障害されます。Erb麻痺とKlumpke麻痺の所見が合併することもあります。下肢においては、骨盤位分娩に多い反張膝・膝関節脱臼、発育性股関節形成不全、さらに、先天性内反足の有無も確認します。これらは自然軽快する場合がありますが、1か月児健診時に所見を認めた場合は専門医の受診を勧めます。

11. 神経学的異常

Point!

① 引き起こし反射、モロー反射は筋緊張や神経系の異常のスクリーニングとして有用です。

筋緊張(筋トーヌス)の評価は児の姿勢に加え、上下肢の筋肉の弾性、関節可動域の亢進や制限の有無などで行います。引き起こし反応(反射)を認めなかったり、水平横抱きで極端なU字型となる場合は筋緊張の低下が、逆に引き起こし反射(反応)で体幹が棒のように立ったり、水平横抱きで頭部や上下肢が伸展する場合は筋緊張の亢進が疑われます。

引き起こし反射、モロー反射、Babinski 反射、把握反射などが所見を取りやすい原始反射です。これらが減弱したり、逆に亢進したりする場合は、何らかの神経系の異常を疑います。

ただ、児が強く啼泣している場合には反射がうまく出現しない場合もあり、状況や再現性 により判断します。

12. 発育性股関節形成不全リスク因子

Point!

- ① リスク因子として、家族歴、女児、骨盤位分娩があります。
- ② 診察所見では股関節開排制限と大腿・そけい部皮膚溝非対称が重要です。

発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)の重要な所見は、ア. 股関節開排制限(床から20度以上の制限)(図4)と、イ. 大腿皮膚溝、そけい部皮膚溝非対称(図5)があります。さらに、ウ. 家族歴(血縁者の股関節疾患)、エ. 女児、オ. 骨盤位分娩(帝王切開時の肢位を含む)がリスク因子になります ^{12,13)}。アを認める場合、または、イからオのうち2項目以上認める場合には、専門医療施設で精密検査を受けることが推奨されています。

下肢を強く伸展させ過ぎたり、開排手技を過度に繰り返したりすると股関節を傷めることがあるため、注意して診察します。

発育性股関節形成不全は予防が非常に重要で、以下の様な指導を行います。

- ・股関節が開きやすいような、着衣、寝かせ方、抱っこの仕方(コアラ抱っこ)を勧めます。
- ・向き癖が強い場合には、向き癖と反対側の脚が立て膝状態になり、股関節が開きにくくなるため、体位変換をしたり、向き癖と反対側からかかわったりするようにします。
- ・M 字型開脚での両脚の自由な動きを妨げない。両脚を長時間伸展位にくるまない扱いが重要です。

日本整形外科学会、日本小児整形外科学会では啓発用のパンフレット*を作成し、発育性 股関節形成不全の予防対策を勧めています。

図4 股関節開排制限



左側股関節は床から35度(20度以上)までしか開かず、開排制限を認めます(日本小児整形外科学会HPより一部改変)。

図5 皮膚溝非対称



左そけい部と大腿中央部に深く長い皮膚溝を認めます(日本小児整形外科学会 IIP より一部改変)。

*日本小児整形外科学会 HP (http://www.jpoa.org/) よりダウンロード可能



13. その他の異常

Point!

① 臀部や大腿内側などの目立たない部位に傷痕などがある場合は児童虐待を疑います。

身体診察においては、児童虐待を疑わせる所見の有無の確認も必要です。所見としては傷痕、打撲痕、出血斑、火傷痕等が重要で、目立たない部位である臀部や大腿内側の皮膚などを特に注意して診察します。育児の状況としては、体重が順調に増加しているか、皮膚を清潔に保てているかも重要な所見です。

また、1か月の間に繰り返し受診歴がある場合には、免疫不全による易感染性や、保護者のメンタルへルスに問題がある可能性なども検討する必要があります。

14. 新生児聴覚検査

Point!

① 新生児聴覚スクリーニング検査で要再検(リファー)だった場合にはその後の対応状況を確認します。

新生児聴覚検査として、スクリーニング検査である自動 ABR や OAE 等が多くの医療施設で入院中に行われています。医療施設退院時に一側でも要再検(リファー)と判定された児は、生後3週間以内に、尿検体によって、先天性サイトメガロウイルス感染症について検査する必要があります。尿検査陽性は2か月以内、陰性の場合は遅くとも3か月以内を目途に専門医療施設での精密検査を行う必要があります。

新生児聴覚検査とその後の診療の流れに関しては、自治体毎に対応方法が異なっている ため、その方法に則って対応する必要があります。

一方、新生児聴覚検査を受けていない(希望しなかった)場合は、突然の音に対する反応で大まかに確認します。しかし、この方法のみでは難聴の早期発見は困難であり、音への反応が気になる場合は専門医療施設での検査が必要になります。

15. 先天性代謝異常等検査の結果説明

Point!

- ① 先天性代謝異常等の検査結果を説明します。
- ② 要再検、精密検査の児では再検査の実施の有無や受診予定を確認します。

先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング)として、現在、公費補助によって 20 疾患が検査されています。検査体制は都道府県によって異なっているものの、多くの場合、検査センターで検査が行われ、異常値の場合に検体を提出した医療施設に再検査の連絡が行きます。極端な異常値の場合は、大学病院等の精密検査実施医療施設にも連絡があることが多く、児は直接、そちらを受診して精密検査が行われます。

多くの児はスクリーニング陰性のため、1か月児健診で結果を説明します。再検査、精密 検査となった児では、再検査の実施の有無や今後の受診予定、さらに異常が疑われる疾患の 症状の有無について、診察所見も含めて確認します。

16. 便色カード

Point!

① 便色カードを用いて、問診または肉眼で便色を確認します。

胆汁うっ滞による閉塞性黄疸を来す場合、便の色調が薄くなって灰白色便を呈することから、便色カードを用いてスクリーニングを行うことが出来ます。母子健康手帳には便色カードが添付されており、便色カードが $1\sim3$ 番の便の色、つまり、白色からクリーム色の便

の場合、もしくは4番でも徐々に薄くなってきている場合は異常と判定します。医師等は可能な限り肉眼で便色を確認するとともに、眼球結膜、皮膚の色調を評価します。閉塞性黄疸では直接ビリルビン有意の黄疸となるため、くすんだ黄色調の皮膚色となります。

特に胆道閉鎖症は早期の治療介入が必要なため、閉塞性黄疸が疑われた場合は、早急に 専門医療施設で精密検査を行う必要があります。1か月児健診時には、便色は、灰白色に なることは稀で、多くは淡黄色ないし黄土色になることが多く、また正常ではほぼ無色透 明の尿の色が黄色調に濃くなることで、気付かれることもあります。疑わしい場合は、経 過を見ないで採血か採尿を行い、直接ビリルビン値か尿中硫酸抱合型胆汁酸値が高値なら (小児外科か小児消化器科の)専門施設を紹介しましょう。

17. ビタミン K₂の投与

Point!

- ① ビタミン K₂の内服状況を確認し、3か月法ではその後の予定も伝えます。
- ② 授乳方法も確認し、母乳栄養の場合には母親の食事指導も重要です。

ビタミン K 欠乏性出血症は主として生後3週間から2か月の間に多く、母乳栄養児や胆汁うっ滞児でリスクが高くなります。突然の頭蓋内出血として発症する場合もあることから予防が重要であり、現在はビタミン K_2 の予防投与が行われています。

ビタミン K_2 の投与方法としては、生後 0 日、5 日(退院前)、1 か月児健診時にビタミン K_2 を内服する 3 回法が従来から行われていました。しかし、3 回法で出血を予防できなかった症例の報告もあることから、近年は入院中の 2 回に加えて、それ以降、生後 3 か月まで週1回、ビタミン K_2 の内服を行う 3 か月法を採用する施設も多くなっています。いずれの方法でも、1 か月児健診時のビタミン K_2 の内服状況を確認します。さらに、3 回法では、特に母乳栄養の場合、母親の食事指導(緑黄色野菜などビタミン K の多い食事摂取)を行い、3 か月法ではその後の内服予定を確認します。なお、1 か月児健診時に人工栄養が主体(おおむね半分以上)の場合には、それ以降の予防投与を中止しても構わないとされています。

第4節 判定について

1か月児健診の標準化、質の向上(精度管理)の観点から、実施医療機関間での判定基準にばらつきが生じないように医師は心掛ける必要があります。1か月児健診の判定結果に基づいた事後指導が、その後の乳幼児健診(4か月児健診、1歳6か月児健診等)の判定結果に与える影響等を検討することで、1か月児健診の重要性がさらに高まるものと思われます。判定には、乳児の健康の保持及び増進、重篤な身体疾患の早期発見に視点を置いた医師の所見による判定と、健康を決定する社会的要因の評価や育児相談支援に対する子育て支援の必要性の判定があります。

(1) 医師の所見による判定

診察後は所見に基づいて判定を行います。判定には異常なし、既医療、要経過観察、要紹介(要精密・要治療)のパターンがあります。判定の例示を表1に示します。

- 1. 異常なし:診察や問診で所見がなく、疾病の疑いがないもの。
- 2. 既医療:健診日より前に診断された疾病や所見を、問診等から把握したもの。
- 3. 要経過観察: 診察や問診等で疾病の疑いがあり、医療機関や行政等で経過観察の必要があるもの。
- 4. 要紹介:診察や問診等で所見があり、医療機関で精密検査が必要なもの(要精密)。 診察や問診等で所見があり、医療機関で治療が必要なもの(要治療)。

表1 判定の例示

既医療

心雑音、口唇裂・口蓋裂

要経過観察

体重増加不良、斜頚、血管腫、色素異常、臍ヘルニア

要紹介 (要精密)

黄疸、姿勢の異常(フロッピーインファント等)、特異的顔貌、目・耳の異常、頭部の異常(頭囲拡大、小頭症、縫合異常等)、心雑音、呼吸の異常(喘鳴等)、そけいヘルニア、外性器の異常、便色カード1~3番、発育性股関節形成不全

要紹介 (要治療)

鼻涙管閉塞、臍炎、発育性股関節形成不全、先天性内反足

(2) 子育て支援の必要性の判定

1か月児健診の目的のひとつである乳児の健康の保持及び増進には、乳児の身体疾患の早期発見のみならず、乳児の健康を決定する社会的要因の評価が大切です。健康を決定する社会的要因には、保護者の心身状態、住宅環境、経済的困窮の有無、喫煙者の有無、事故防止の対策などが含まれます。特に保護者の睡眠状態や、産後うつの有無の確認は、1か月児健診でも確認が必要です。母子健康手帳から妊婦健診、産後2週間健診の保護者の状態や、エジンバラ産後うつ病自己評価票(EPDS)の値などから評価を行います。心配事の有無も直接尋ね、さらに、産後の体の回復のために、たんぱく質やミネラル、ビタミンなどの食事摂取ができているかも確認が必要です。問診票から抽出された情報や診察時の会話や仕草から、子育て支援の必要性の判定を行い、健診票に記入します。

判定は、1. 特に問題なし、2. 保健師による支援が必要、3. その他の支援が必要、から選択します。保健師による支援とは、育児相談、生活相談を示し、その他の支援とは、管理栄養士・栄養士による栄養相談や、医療機関による産後のメンタルヘルス支援や、要保護児童対策地域協議会(要対協)等による支援対象児童等(要保護児童もしくは要支援児童及びその保護者)への対応を示します。

第2部 1か月児健康診査時に注意すべき項目

第1章 健康を決定する社会的要因 (Social determinants of health: SDH) の評価

人間の健康は、個人の資質や生活習慣だけで決定されるものではなく、その人が置かれた周囲の環境や社会構造に大きく影響されます。健康を決定する社会的要因(Social determinants of health: SDH)とは、個人を取り巻く環境に存在する心身の健康に与える因子を指し、健康格差の主因となります。こどもに最も影響する SDH は、保護者・家庭です。保護者・家庭の因子としては、心身の健康状態、経済状況、生活習慣、嗜好などがあげられます。これらの因子には、健康促進につながる「保護因子」と、健康を損なう「リスク因子」があります(表 2)。健診を行う際には、特に保護者・家庭の SDH に注目し、保護因子の促進、リスク因子の低減につながる介入を心がける必要があります。

表2 こどもの健康促進につながる保護因子とリスク因子

	保護因子	リスク因子
保護者(親)	必要時に誰かに支援を求めること	保護者としての機能不全(薬物使
	ができる、支援を得られる社会的	用、家庭内暴力、精神疾患)、離婚・
	つながりがある、ペアレンティン	別居、ペアレンティングの知識が
	グの知識がある、こどもの発達に	ない、貧困
	関する知識がある	
家庭	物理的・社会的・情緒的に安定した	家庭内の喫煙、飲酒、薬物使用、物
	家庭環境	理的・社会的・情緒的に不安定な家
		庭環境
コミュニティ	安全な近隣、安全で質の高い学校、	安全が充分に担保されず、レベルが一定
	安全な住居、栄養価の高い食料へ	基準に達していない学校、安全でな
	のアクセス、医療ケアへのアクセ	い近隣、安全でない住居、食料不
	ス	足、乏しい雇用機会、乏しい移動手
		段、乏しい医療ケアや社会資源へ
		のアクセス

(文献14より引用改変)

第1節 親子関係の評価

保護者が落ち着いた状態であるかが重要なポイントです。保護者の表情、赤ちゃんへの声かけや、赤ちゃんをあやす様子、抱っこする様子などを観察します。「赤ちゃんとの生活はどうですか?」などとたずね、赤ちゃんに対する気持ちを聴取します。赤ちゃんと一緒にいても楽しそうでない、抱きしめたり視線を合わせたりしない、「赤ちゃんが嫌い」と否定的

なことを言う、赤ちゃんを見る目が険しい、家族のことを話したがらない、赤ちゃんに対する過度の不安や無関心、衣服やおむつの清潔が保たれていない、外傷痕があるなど、虐待または不適切な扱い(マルトリートメント)が疑われる状況には、特に注意を払うようにします ¹⁵。

第2節 両親と家族の健康評価

母子健康手帳・問診票から、出産の状況、精神疾患を含めた母体合併症と治療の状況、感染症などの情報を把握し、不足している対応がないかを確認します。出産の疲れが癒えないまま子育ては始まります。睡眠不足や慣れない授乳、産後のホルモンバランスの変化など、母親の心身が不安定になる時期です。父親(パートナー)や祖父母、知人など、周囲の援助が得られる状況であるかを確認します。母親だけでなく、父親(パートナー)にも産後うつのリスクはあります。母親に対してだけでなく、父親(パートナー)へのエンパワーメントも必要です。

※母子健康手帳による確認項目

出産の状態 早産、多胎、分娩異常 (緊急帝王切開、胎盤早期剥離など)、新生児仮死など 母体合併症 (妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病や甲状腺疾患等)

母親の精神疾患

母体感染症(B型肝炎、C型肝炎、HTLV-1、風疹、梅毒等)

常用薬、過去の妊娠歴(死産など)

第3節 生活環境の評価

母子健康手帳・問診票、医師やメディカルスタッフによる聴き取りから、家庭の経済状況、 雇用状況、居住環境、家族の構成人数(きょうだいの有無を含む)などを確認します。養育 困難が予想される状況(経済的困窮、ひとり親、家庭内不和、援助者不在など)がないかを 確認し、必要に応じてこども家庭センター等の自治体の担当窓口につなぐようにします。保 護者の養育の知識やスキルについても、把握する必要があります。また、同居の家族の喫煙 などのリスク因子、父親(パートナー)の育児休暇の取得、母親の復職(復学)予定の確認 をしておくようにします。

※母子健康手帳による確認項目

母親の年齢(若年出産、高齢初産)、保護者(父親(パートナー)が空欄)、職業(不安定な就労、経済的困窮)

妊婦自身の記録(全く記載がないもの)

妊娠中の経過(分娩時が初診、初回健診時期が妊娠中期以降など)

喫煙・飲酒の習慣

第4節 事故予防の評価

問診票から、赤ちゃんの睡眠環境への配慮や、転落などの事故予防への意識を確認します。 仰向け寝を推奨し、窒息の可能性のある柔らかい寝具を避ける、ベッドにおもちゃを置かない、上方に物を吊るさないなどの具体的な対応を説明します。自動車のチャイルドシートについては、当該月齢に対応していることを確認の上、助手席に設置しない、後部座席に後ろ向きに取り付け、ハーネスを止めるなどの説明をします。

第5節 その他

メディア (SNS、インターネット) との関わりについての啓発が重要です。授乳の際にテレビや動画を見ることや、スマホの操作をしないよう伝えます。赤ちゃんについては、2歳までのメディア接触を控えるよう、あらかじめ伝えておきます ¹⁶⁾。

家庭を取り巻く地域(コミュニティ)の状況、医療資源へのアクセス、産後ケア事業や託 児施設、子育て支援施設、福祉サービスの状況を把握しておくことも重要です。

第2章 栄養

授乳は赤ちゃんに栄養素等を与えるとともに、親子の絆を深め、赤ちゃんの心身の健やかな成長・発達を促す上で極めて重要です。

母子にとって母乳は重要としつつ、母子の健康状態等の理由から人工乳を選択する場合もあり、授乳の支援に当たっては母乳だけにこだわらず、必要に応じて人工乳を与える等、適切な支援を行うことが必要です。健診を実施する医師は、母親等と赤ちゃんの状態を把握しながらあせらず授乳のリズムを確立できるよう支援します。

ビタミン D 欠乏の乳児が増しており、ビタミン D 欠乏を予防する啓発・教育活動も重要です。ビタミン D の生合成には紫外線の作用が必要であるため過度の日焼け止めの使用を行わないこと、ならびに、天然型ビタミン D のサプリメント $10\,\mu$ g (400 I U) /日の使用を $1\,\mu$ か月児健診であらためて伝えます。

母乳育児

短期的な利点として、感染症予防や乳幼児突然死症候群 (SIDS) 発症リスクの低下があり、 長期的な利点として、認知能力の向上、社会的行動の改善、2型糖尿病や白血病罹患リスク の低下、自閉スペクトラム症発症リスクの低下などがあげられています ¹⁷⁾。

日本でのデータから母乳の利点をみると、生後 $6\sim30$ か月の児が川崎病により入院するリスクの低下 $^{18)}$ 、生後 $6\sim42$ か月の児が気管支喘息により入院するリスクの低下 $^{19)}$ 、RS ウイルス細気管支炎で入院した場合、母乳だけで育てられている児は、人工乳主体の児よりも

入院期間が短縮される 20 、生後 18 ~42 か月児の気道感染や下痢による入院を減少させることが報告されています 21 。母親と児の周囲で感染症が流行している場合、母親の腸管内に侵入した病原体はパイエル板 18 細胞から取り込まれ、樹状細胞を介して 18 保知胞に抗原提示されます。その結果、 18 細胞は分泌型 18 打体を産生するようになり、胸管や血管系を経て乳腺に定着し、母乳中に分泌型 18 打体を分泌します 22 のまり、児は母乳を飲むことで自然と周囲で流行している感染症の特効薬をもらうことになります。

赤ちゃんが欲しがるサインや、授乳時の抱き方、乳房の含ませ方等について伝え、適切に 授乳できるよう支援します。また、母乳が足りているか等の不安がある場合は、赤ちゃんの 体重や授乳状況等を把握するとともに、母親の不安を受け止めながら、自信をもって母乳を 与えることができるよう支援します。

母親に対する母乳の利点

母乳で育てることで得られる短期的効果には、子宮復古、授乳による無月経、体重減少、産後うつの軽減、ストレス・不安の軽減があげられています。長期的には乳がん、卵巣がん、子宮体がんなどの発症率減少、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、メタボリックシンドロームなどの発症率減少、関節リウマチやアルツハイマー型認知症、多発性硬化症の発症率減少などがあげられています²³⁾。このような情報は、児の栄養方法を決めるうえで重要であり、妊娠中のうちに伝えておく必要があります。

混合栄養

混合栄養は、母乳分泌不足、母親の健康上の要因、疲労等、母親が何らかの理由で母乳を十分に与えられない場合、母乳と人工乳を合わせて与える方法です。母乳分泌が十分ある母親が夜間に人工乳を与えて、直接授乳の間隔があきすぎると、乳腺炎や乳管閉塞のリスクになるので注意が必要です。また、母乳が足りないように感じて人工乳を与える場合もあるため、体重増加が良好で、人工乳を減らすことができると判断した場合は、母乳育児に精通した助産師や小児科医等と相談することも検討してください。

母乳を少しでも与えているなら、母乳育児を続けるために人工乳を有効に利用するという考え方に基づき支援します。母乳の出方や量は異なるため、混合栄養の取り入れ方については、母親の思いを傾聴すると共に、母親の母乳分泌のリズムや赤ちゃんの授乳量等に合わせた支援をします。人工乳の使用方法や飲み残しの取扱等について、安全に使用するよう伝えます。

人工栄養

人工栄養においては、1回ごとの厳密な授乳量や授乳間隔にとらわれることは、育児不安の原因となります。赤ちゃんの欲しがるサインや、授乳時の抱き方、哺乳瓶の乳首の含ませ方等について伝え、適切に授乳できるよう支援します。生後1か月頃の児は、反射として吸

啜するため、満腹でも与えれば与えるだけ人工乳を飲むこともあります。通常は 200 mL/kg/日を上限の目安とするように伝えます ²⁴⁾。 なお、授乳を通して、親子のスキンシップが図られるよう、しっかり抱いて、優しく声かけを行う等の温かい触れ合いを重視するように伝えます。

乳児用調製粉乳を調乳する際の注意点

哺乳瓶の消毒方法には主に3つあります。1)煮沸消毒:大きめの鍋にお湯をわかして、哺乳瓶をいれます。乳首は3分くらい、それ以外の部分は5分くらいで取り出します。2)消毒液(次亜塩素酸ナトリウム)を用いる方法:この薬液に一定時間哺乳瓶をつけて消毒します。おわったらそのまま水気をとって終了です。専用容器と薬剤の購入が必要ですが火傷の心配はありません。3)電子レンジ消毒:最近は電子レンジ消毒専用の容器・袋が販売されています。その中に規定量の水と哺乳瓶をいれて電子レンジで加熱します。加熱時間・ワット数は説明書をよく読んでください。高温になるので、電子レンジから取り出すのはある程度時間をおいてからにしましょう。

Cronobacter sakazakii は健康な人に病気を起こすことはほとんどありませんが、新生児から乳児では髄膜炎や腸炎を起こす可能性があるため、調乳に際して注意が必要です。具体的には、授乳の直前に 70° C以上のお湯で調乳し、人肌に冷ましてから与えます。なお、液体ミルクは無菌であるため、加熱の必要はありません。

液体ミルク:液体ミルクは災害時の備えとして広まっています。常温での保管が可能であり、調乳の手間を省くことができ、赤ちゃんが欲しがるときすぐに与えることができます。 液体ミルクを取り扱う際に注意すべき点として、製品により、容器や設定されている賞味期限、使用方法が異なります。使用する場合は、製品に記載されている使用方法等の表示を必ず確認することが必要です。

第3章 見逃してはいけない徴候・疾患

1. 緊急性のある徴候

1か月児健診であったとしても、来院時の症状、身体所見によっては、緊急対応を要する 場合があります。

バイタルサインとしては、多呼吸(呼吸数 60 回/分以上)、頻脈(180 拍/分以上)もしくは徐脈(60 拍/分未満)、 SpO_2 低下(95%未満)、発熱(37.5 $^{\circ}$ C以上) $^{25)}$ などを認める場合は注意を要します。

さらに、身体所見としては、努力呼吸(多呼吸、陥没呼吸など)や喘鳴、含気低下など呼吸困難症状、チアノーゼ、末梢循環不全を認めた場合は早急な対応が必要になります。脱水の場合は、ツルゴールの低下、大泉門陥凹などを認めます。著明な肝脾腫大は心不全、肝疾患、腫瘍の精密検査が必要になります。

多発外傷や栄養障害では、症状に応じた対応とともに、必要に応じて虐待の鑑別が必要となります。

2. 緊急性のある疾患

上記の様な徴候を来す疾患のうち頻度の高いものに、急性感染症があります。細菌性髄膜炎、敗血症、尿路感染症、肺炎、気管支炎などでは、呼吸障害、チアノーゼ、発熱、活気低下を呈します。なお、感染症の原因病原体としては、RS ウイルス、パレコウイルス、Covid-19 などのウイルス、B 群溶連菌、ブドウ球菌、大腸菌、インフルエンザ桿菌、肺炎球菌などの細菌が重要です。

さらに、先天性疾患でも早期新生児期には症状がはっきりせず、その後、心不全が進行するもの、喉頭・気管・気管支軟化症や気管狭窄症などの呼吸器疾患も体重増加とともに症状が悪化してくるものがあります。

消化管疾患としては、肥厚性幽門狭窄症は1か月前後の発症頻度が高く、短域型の Hirschsprung 病では徐々に腹部膨満が増強し、嘔吐や排便障害を来してくる場合もありま す。嘔吐を来す疾患としては、消化管アレルギーも念頭に置く必要があります。

3. 早期診断、早期治療が必要な疾患

第1部の第3章で取り上げた新生児代謝異常等検査の陽性例、聴覚スクリーニング要再 検例における先天性サイトメガロウイルス感染症、重症黄疸や閉塞性黄疸(胆道閉鎖症等) では、早期診断、早期治療が重要です。

感染症を繰り返している児においては、免疫不全症の可能性を疑います。

眼科的疾患に関しても、白色瞳孔・猫目、角膜混濁、瞳孔の異常、瞳孔領白濁、眼球や角膜の左右差などを認めた場合、その後の視機能に大きく影響する疾患(網膜芽細胞腫、先天緑内障、先天白内障、眼底疾患など)の所見である場合があります。1か月児健診では、家族の情報聴取に加え、眼科診察ではペンライトを使用し、外眼部や前眼部の異常徴候を検出することが望ましいとされています。近年、検影器を用いて眼底からの赤い反射を観察するred reflex法(検影法)が、白内障や眼底疾患のスクリーニングに有用であると報告されています²⁶⁾。

4. 徴候から早期診断・治療に結びつく可能性のある疾患

筋緊張低下は様々な疾患の症状として重要であり、1か月児健診で確認し対応することは、その後の診断や治療、療育に結びつく可能性があります。ダウン症(21トリソミー)やプラダーウィリー症候群、さらに、脊髄性筋萎縮症など様々な神経筋疾患なども、この時期に異常を指摘されて診断に至る場合があります。

5. 指導により予防できる疾患

向き癖が強い場合、頭蓋や顔面の変形に加え、発育性股関節形成不全が進行、増悪する可能性があります。また先天性筋性斜頚による頭蓋や顔面変形を予防する必要があります。リスクを評価して適切に専門医療施設につなぐことに加え、適切な体位変換、M字型開脚の姿勢やコアラ抱っこ、下肢の動きを制限するような着衣を避けるなどの指導によって、疾患を予防する事が大切です。

さらに、うつ伏せ寝を避けたり、家族の禁煙を指導したりするなど、乳幼児突然死症候群 (SIDS)のリスクとなる要因を減らすことも重要です。

第4章 睡眠衛生指導

赤ちゃんの睡眠

生後すぐの赤ちゃんは、体内時計がうまく機能していませんので、地球の時間に合わせた自然な覚醒―睡眠のリズムは整っていません。人はレム睡眠(浅い眠り)とノンレム睡眠(深い眠り)を繰り返していますが、生まれたばかりの赤ちゃんはレム睡眠が多いため、すぐに起きてしまいます。ノンレム→レム睡眠の周期は40~50分と言われており、総睡眠時間は15時間前後になります²⁷⁾。覚醒―睡眠リズムは、生後7週前後に形成され始め、生後8~11週で8割の赤ちゃんがリズムを獲得します。つまり、生後3か月ぐらいから、昼間に起きていることが多くなり、ノンレム睡眠が多くなると昼夜の区別がつくようになってきます。1か月児健診のときに、図6に示すような生後間もなくから1歳ぐらいまでの赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムを保護者に示してあげると、見通しがたつかもしれません。覚醒―睡眠リズムを復得するためには、"光"と"音"が大切です。朝の光を浴びることと、夜間の授乳時には、部屋を明るくせず間接照明を使用することを勧めます。日中の炊事や洗濯などの生活音も覚醒―睡眠のリズムを得るためには必要になります。妊娠中から保護者に赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムについて伝えておくと、出産から1か月児健診受診までの慌ただしい日々の中で保護者も安心して育児ができます。

保護者の睡眠

赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムが保護者の覚醒―睡眠リズムに影響を及ぼします。保護者は赤ちゃんの授乳やおむつ交換などの世話のために夜間に頻回に睡眠の中断を余儀なくされ、疲労が溜まってきます。母親が妊娠の前の状態に戻る産褥期の終わり頃(6週前後)が、母親の睡眠時間は最も減少し、入眠潜時(寝付くまでの時間)も長くなります。赤ちゃんが覚醒―睡眠リズムを獲得し始める産後10週頃より急速に母親の睡眠リズムは改善し、24時から5時頃にかけては80~90%の母親は眠ることができるようになります²⁸⁾。睡眠不足の持続は、産後うつとの関係性が指摘されています²⁹⁾。保護者に関する睡眠についても、妊娠中から睡眠の重要性、赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムの獲得に関する知識、産後の睡眠障害

や睡眠不足とうつ状態の関係性など睡眠教育を行うことが、産後の睡眠、寝つき、抑うつの 改善をもたらすことが指摘されています²⁹⁾。




図6 乳幼児期の睡眠・覚醒リズムの発達

(文献30より引用改変)

第5章 新生児期に認められる疾患

「診察」や「見逃してはいけない徴候・疾患」で触れなかったものを中心に、1か月児健診時に認める頻度の高い疾患を挙げます。

(1)皮膚疾患

①皮膚炎

脂漏性湿疹は皮脂分泌が多い頭皮や眉間、額に好発し、鼻、頬、外耳道、耳介後部にも出現します。よだれかぶれは口周囲から顎に、おむつ皮膚炎はおむつで覆われた部位に好発し

ますが、発赤に留まるものから、重症化してびらんを認める場合もあります。また、外陰部にも広がる紅色丘疹はカンジダ皮膚炎を疑います。皮膚を清潔に保つことを基本に、症状に応じて外用薬を塗布します。

発赤を伴った水疱(一部、びらん)を認めた場合は、伝染性膿痂疹やブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)の可能性があります。

②色素異常

蒙古斑は臀部や背部に認める青色色素斑で、多くは成人までに消退します。四肢・体幹等に認める場合は、異所性蒙古斑と呼びます。太田母斑は顔面の三叉神経領域に出現し、自然退色傾向はありません。茶褐色色素斑が多発している場合は神経線維腫症1型(von Recklinghausen 病)の鑑別が必要になります。

その他、色素性母斑、白斑、脱色素斑なども、多発したり、広範に認めたりする場合は全身性疾患が疑われます。

(2) 目、口、耳の異常

①目の異常

「見逃してはいけない徴候・疾患」で挙げた眼疾患のスクリーニングが重要ですが、その他、頻度の高いものとして、眼脂があります。多くは鼻涙管狭窄に伴うものであり、清浄綿での清拭と鼻根部マッサージでほとんどが軽快します。一方、結膜充血を伴っている場合は、感染性結膜炎が疑われます。

②口の異常

明らかな口唇・口蓋裂は既に診断されているはずですが、口蓋垂裂や口蓋の菲薄化などがあった場合は粘膜下口蓋裂が疑われます。舌小帯短縮症は哺乳障害が無い限りは経過観察でよく、上唇小帯短縮症も自然軽快が期待できます。上皮真珠は歯肉に生じる小丘疹で、自然消退します。先天歯が萌出し、哺乳に影響する場合には抜歯も検討します。

③耳の異常

折れ耳、埋没耳、たち耳などの耳介変形は生後早期であれば保存的治療が可能な場合もあります。また、副耳の治療を希望する場合も形成外科や耳鼻咽喉科を紹介します。

耳前瘻孔は治療を要しませんが、その後の経過中に感染を合併することがあり、その際は 耳鼻咽喉科を受診するよう伝えておきます。

(3)心雑音

病的心雑音と無害性心雑音がありますが、心雑音に加え、多呼吸やチアノーゼ、体重増加不良などを認めた場合は、速やかに小児循環器科を紹介します。比較的頻度の高いものとして末梢性肺動脈狭窄があり、全身状態は良好で、収縮期に胸骨左縁上部(左鎖骨下部)から腋窩・背部に放散する駆出性雑音を聴取します。この場合は基本的に経過観察で構いませんが、それ以外の部位、性状の心雑音の場合は、1か月以内を目安に小児循環器科を紹介しま

す。なお、心雑音の有無に関係なく、パルスオキシメーターによるスクリーニング評価は、先天性心疾患の発見に有用とする意見もあります 31 。また、先天性心疾患の中には、新生児期には気づかれず 1 か月児健診で初めて心雑音が指摘される場合もあります。

(4)腹部・腰背部の異常

①腹部膨満

器質的疾患の鑑別のためには、膨満の程度、緊満感、肛門の形状、哺乳・体重増加、さらに排便回数や便の性状を確認します。空気嚥下症(呑気症)でも著明な腹部膨満を来す場合があり、排気のタイミングや肛門刺激などの指導を行います。

②下腹部の腫大

そけい部の腫大・隆起で最も多い原因はそけいヘルニアであり、触診で脱出内容に触れ、 圧迫により腹腔内に還納されれば診断は確定します。還納できたとしても、早めに小児外科 を紹介します。女児で腫大部位に小腫瘤を触れた場合は、卵巣の脱出が疑われます。

③臍の異常

臍肉芽腫と考えられていた場合でも、難治性だったり、浸出液が多い場合は臍ポリープ、 尿膜管遺残症等の可能性があり、小児科か小児外科を紹介します。また、臍帯脱落遅延を認 めた場合には免疫不全の可能性があり、臍炎や他の皮膚感染症を伴った場合は小児科を紹 介します。

(5) 泌尿生殖器の異常

陰茎が腹側へ極端に折れ曲がっていたり、外尿道口の位置異常を認めたりする場合、尿道 下裂を疑い、泌尿器科か小児外科を紹介します。

陰嚢水腫の診断には透光試験が有用です。多くは2歳までに軽快するため、経過観察とします。

(6) その他

比較的軽微な形態異常(小奇形)でも、3つ以上合併した場合は何らかの先天的要因が疑われます。そのため、紹介する際には、形態異常の専門領域に加え、小児科への紹介を行うことが勧められます。

第6章 1か月児健康診査の留意事項

第1節 1か月児健診を起点とする子育て支援

自治体向け1か月児健診の留意事項として、「通知」において「委託先の医療機関と連携を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより伴走型相談支援の効果的な実施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであ

ることに留意し、こども家庭センター等の関係機関とも連携しながら、必要な支援体制の整備を行うこと。」と記されています。 1 か月児健診を起点とし、生後 2 か月からの予防接種の機会などを活用し、全例を対象に健診における評価が継続した子育て支援につながることが期待されています。

月1回の予防接種の機会に合わせて支援を行うことで、軽微な不安の多くは対応可能です。一方で保護者の様子に不安が感じられる場合、行政機関との情報共有を考慮します。行政機関は母子健康手帳交付時からの情報、場合によっては妊婦健診受診時の情報も把握しているかもしれません。家庭訪問などアウトリーチも可能で、精神科との連携などの判断が容易になります。したがって医療機関は、些細なことでも地域行政機関と情報共有ができる関係性を日頃から構築をしておくことが重要です。行政サービスとして行われる産後ケア事業や産後ヘルパー派遣事業などについても把握し、保護者の状況に応じて必要な事業を紹介します。育児サークルなどの地域の社会資源の情報を案内することも有効な場合があります。

第2節 虐待の可能性が疑われた場合

虐待はどの年齢でもみられますが、死亡事例は0歳、特に日齢0など乳児期早期に多くみられます。1か月児健診では、虐待を発見し通告するだけでなく、虐待リスクを早期に評価し虐待予防に繋げることが求められます。

虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類に分類されますが、1 か月児健診においては、身体的虐待とネグレクトに注意しましょう。体重増加不良、からだや衣類の汚れ、不自然なあざや外傷痕、健診時の保護者の言動などから虐待を疑います。また、問題なさそうにみえても、健康を決定する社会的要因*にリスクがある場合は、慎重に観察しましょう。リスク要因を持つ家庭を把握するためのアセスメントについて、こども家庭庁が作成した「子ども虐待対応の手引き(令和6年4月改正版)」などを参考にして下さい。また、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務がある(児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項)とともに、医療従事者には児童虐待の早期発見の努力義務(同法第5条第1項)があります。虐待が疑われた場合には、すみやかにこども家庭センター等の自治体の担当窓口や児童相談所等に通告してください。緊急度が高い場合は警察に通告します。通告後は関係機関と連携して対応しましょう。予定された健診を受診されない場合も注意が必要です。

虐待のリスクも含め、育児支援が必要と考えられる例においては、把握した情報や支援が必要と考えられる理由なども健診票に加筆して連絡することや、緊急性に応じ、(健診票での連絡に加えて)こども家庭センター等への電話連絡なども随時行うと良いでしょう。

*健康を決定する社会的要因:経済状況、雇用状況、居住環境、食料の安定性、親子関係を含む生活環境、産後の保護者のメンタルヘルス、医療ケアへのアクセス等

◎ 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)

虐待を疑った時に、すぐに児童相談所に通告できる全国共通の電話番号です。「189」にかけると、固定電話の場合は管轄の児童相談所へ転送されます。携帯電話の場合はオペレーターとのやりとりで、管轄児童相談所を特定し転送されます。

第3節 予防接種のスケジュール説明

乳児に対する予防接種は、ロタウイルスワクチン以外は生後2か月から接種が可能となります。ロタウイルスワクチンの初回接種は生後2か月から出生14週6日までに開始することが標準的(生後6週から接種は可能)です。乳児期早期では、予防接種の対象疾患となっている感染症に罹患すると重篤化し生命の危険が生じる可能性もあることから、生後2か月になると速やかに接種ができるようにスケジュールを組むことが重要です(図7)。予防接種を進めていくにあたり、まずは接種を受けようとする医療機関を決めるのが最初です。そして保護者が接種に対して少しでも不安がある場合は、接種する医療機関で説明を受けるように伝えてください。同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能ですので、接種する医療機関と相談するように伝えてください。なお、小児科学会から同時接種に対する考え方が示されておりますので参考にしてください。なお、予防接種は予約制で実施している医療機関が多いことから、生後1か月のうちに予約をするようにしてください。生後1か月児健診で保護者にお伝えいただきたいことは、以下の3点です。

- ① 予防接種の必要性と安全性の説明
- ② 接種する医療機関を決める
- ③ 生後1か月のうちに予約する

図7 生後2か月から始める予防接種スケジュール

		2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7~8か月
五種沿	昆合	1	2	3			
小児用肺	炎球菌	1	2	3			
B型肝	F炎	1	2				3
ロタウイルス	1価 (ロタリックス®)	1	2		1回目	 を遅くとも生	後14週6日
(1価または5価)	5価 (ロタテック*)	1	2	3		までに受け	ます
BC	G				1		

上記は2024.10 現在の予防接種スケジュール。最新のスケジュールは下記から確認下さい https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20241114_vaccine_schedule.pdf (参照 2024-11-30)

コラム

乳児が罹患すると重症化する可能性のある RS ウイルス感染症に対する予防のために、従来よりハイリスク児を対象としたモノクローナル抗体製剤が保険適用されていますが、2024年3月、より効果の持続期間が長いモノクローナル抗体製剤 ³³⁾が薬事承認され、ハイリスク児を対象に保険適用となりました。また、妊娠 24~36 週の妊婦に接種する母子免疫ワクチン ^{34,35)}が 2024年1月に薬事承認されています。

第7章 1か月児健康診査時の保護者の心理的支援

第1節 保護者の心理的状況

育児が始まることによって保護者の生活は一変します。

24 時間休みがない状況で疲労・不眠が蓄積する一方で、赤ちゃんを愛しく思い、守ってあげたいという感情(ボンディング)が芽生え、赤ちゃんの問題を見逃すことに対する不安などによって過覚醒状態が持続します。しかし、言葉を話せない赤ちゃんの欲求を確実に受けとめることは難しく、自分の思うようにならない育児に直面することが多くなると、自己肯定感が揺らいで悲しみや怒りを覚えたり、育児に対する不安(母乳・ミルクが足りているか、また、自分には赤ちゃんの抱えた問題を解決できないのではないかなど)が増したり、逆に、赤ちゃんへの関心が薄くなったりするリスクが高くなります。最終的に、育児不安が産後うつ病に、赤ちゃんへの関心の薄れがボンディング障害へと進行する可能性は誰にでも存在します。そして、このようなメンタルへルスの問題を抱えた保護者は、自らそのことを訴えることができない傾向にあります。そのため、保護者の抱えている心身の問題については医療者側から可能な限り積極的にアプローチし、その社会的背景(環境)も含めて傾聴することによって、必要な支援を検討・実践していく必要があります。

第2節 心理的アセスメント

赤ちゃんの保護者の心理的アセスメントの目的は、新しい家族が加わったことによる環境変化の心理的影響を早期に察知し、適切な支援を提供することです。リスク評価には、うつ病、不安、自殺念慮などが含まれます。保護者に対する質問ツールを使用したスクリーニングが重要です。出産後2週間前後で行われる産後2週間健診でも、育児の不安や悩みについて相談を行うことが必要です。

エジンバラ産後うつ病自己評価票 (EPDS)

エジンバラ産後うつ病自己評価票 (EPDS) は、1987 年に英国で開発されたスクリーニングツールで ³⁶⁾、その有用性が高く評価されています ³⁷⁾。(図8) 10 の質問で構成されてい

て、各質問の点数(0~3点)の合計で評価します。本邦では、産後4週目に8~9点をカ ットオフ値としています。特に不眠、非哀感、流涙、自傷に関する質問項目7~10で高得 点の場合、重度の産後うつ病に移行しやすく注意が必要です 38)。

図8 エジンバラ産後うつ病自己評価票日本版(Edinburgh Postnatal Depression Scale: EPDS)質問項目

ご出産おめでとうございます。ご出産から今までのあいだにどのようにお感じになったかをお知らせ下さい。 今日だけでなく、<u>過去7日間</u>にあなたが感じたことに最も近い答えに〇をつけて下さい。

- 1) 笑うことが出来たし、物事のおもしろい面も 6) することがたくさんあって大変だった。 わかった。
 - (0) いつもと同様にできた。
 - (1) あまりできなかった。
 - (2) 明らかにできなかった。
 - (3) まったくできなかった。
- 2)物事を楽しみにして待った。
 - (O) いつもと同様にできた。
 - (1) あまりできなかった。
 - (2) 明らかにできなかった。
 - (3) ほとんどできなかった。
- 3)物事が悪くいった時、自分を不必要に 青めた。
 - (3) はい、たいていそうだった。
 - (2)はい、時々そうだった。
 - (1) いいえ、あまり度々ではない。
 - (O) いいえ、そうではなかった。
- 4) はっきりした理由もないのに不安になったり、 9) 不幸せな気分だったので、泣けてきた。 心配した。
 - (O) いいえ、そうではなかった。
 - (1) ほとんどそうではなかった。
 - (2)はい、時々あった。
 - (3) はい、しょっちゅうあった。
- - (3) はい、しょっちゅうあった。
 - (2)はい、時々あった。
 - (1) いいえ、めったになかった。
 - (O) いいえ、まったくなかった。
- () 内は点数を示す。

- - (3)はい、たいてい対処できなかった。
 - (2)はい、いつものようにはうまく対処できな かった。
 - (1) いいえ、たいていうまく対処した。
 - (O) いいえ、普段通りに対処した。
- 7) 不幸せな気分なので、眠りにくかった。
 - (3) はい、ほとんどいつもそうだった。
 - (2)はい、ときどきそうだった。
 - (1) いいえ、あまり度々ではなかった。
 - (O) いいえ、まったくなかった。
- 8) 悲しくなったり、惨めになったりした。
 - (3) はい、たいていそうだった。
 - (2) はい、かなりしばしばそうだった。
 - (1) いいえ、あまり度々ではなかった。
 - (O) いいえ、まったくそうではなかった。

 - (3) はい、たいていそうだった。
 - (2)はい、かなりしばしばそうだった。
 - (1) ほんの時々あった。
 - (O) いいえ、まったくそうではなかった。
- 5) はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。 10) 自分の体を傷つけると言う考えが浮かんでき t= .
 - (3) はい、かなりしばしばそうだった。
 - (2) 時々そうだった。
 - (1) めったになかった。
 - (0) まったくなかった。

(文献39より引用改変)

EPDS の解釈

EPDS は自己記入式であるため、他人に本心を知られたくないという保護者の心理状態に影響されることがあります。結果の解釈には、点数だけでなく、保護者の態度や問診情報を総合的に考慮する必要があります。日本版 EPDS $^{39)}$ の感度は 0.75、陽性的中率は 0.5 とされていますが 40 、産後うつ病の見逃しリスクも残るため、医療者のもつ違和感も重要視されています。

英国国立医療技術評価機構 (NICE) で推奨される2項目質問票 (Whooley の2項目質問票) その他のスクリーニング法として、Whooley の2項目質問票があります (表3)。1か月 児健診問診票の21.と22.に含まれています。2つの質問のうち1つでも「はい」があれば、抑うつ状態の可能性が高いと判断して、精神科を含めたフォローアップを検討します。

表3 Whooley の2項目質問票

気分が沈んだり、憂鬱な気持ちになったりすることがよ くありましたか。 (いいえ・はい)

物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがありましたか。

(いいえ・はい)

第3節 心理的支援方法

第1節・第2節に記してある保護者の心理的状況の観察とアセスメントを実施した後に、 支援が必要と判断された場合には、支援方法についての検討を行います。

保護者のメンタルヘルスへの支援や治療が必要と判断した場合には、適切なタイミングで精神科医への紹介を行います。その際、健診を実施する医師は、患者の苦しみに共感的な理解を示しつつ、産褥期のメンタルヘルスに関する情報提供や、治療の有効性、安全性、有害事象について説明をすることで、保護者の治療へのコンプライアンスが高まるようにします⁴¹⁾。

一方、保護者と生後1か月の赤ちゃんとの関係性に関する支援が必要な場合や、生活環境に起因する不安等に関する心理的支援が必要な場合は、1か月児健診実施医療機関と行政機関との連携による支援も大切です。

その他には産後ケア事業を利用することも医療者から勧めます。短期入所(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型(個別・集団)、居宅訪問(アウトリーチ)型の3種類の実施方法があり、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房のケア、母親の話を傾聴する等の心理的支援、児の状況に応じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育児をしていくうえで必要な社会的資源の紹介等の支援を受けることができます。

1か月児健診時に支援が必要と感じたら、迷わず自治体の担当窓口に状況を知らせることが必要です。公益社団法人日本産婦人科医会から、妊産婦のメンタルヘルスをより良くするための基本的な考え方と方法をまとめた「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」が発刊されています⁴²⁾。

第8章 1か月児健康診査で保護者から寄せられる質問

湿疹

新生児痤瘡、乳児脂漏性皮膚炎などの皮膚のトラブルが生じやすい時期です。皮膚症状の多くは、石鹸や洗浄剤を使って洗うことで過剰な皮脂を落とし、皮膚表面の細菌数を減らすだけで改善します。洗った後に石鹸等が残らないよう、ぬるま湯で丁寧にすすぎ、擦らずに柔らかいタオルで押し拭きするようにします。症状に応じて、ステロイド外用薬を処方します。

※スキンケアの勧め

新生児期からのスキンケアにより、皮膚のバリア機能を健常に保つことがアトピー性皮膚炎の発症を抑制するという報告があります。また、スキンケアを行うことで食物抗原による経皮的な感作を防ぎ、食物アレルギーの発症を予防する可能性が示唆されています (43)。

あざ

いちご状血管腫(乳児血管腫 infantile hemangioma: IH)のうち、声門下(気道閉塞)、 眼瞼周囲(視力障害)、口唇・口周囲(哺乳障害)、頚部・陰部など(潰瘍形成)のような、 機能障害や合併症、生命危機のおそれがあるものは、経口プロプラノロールの適応となるた め、早急に専門医へ紹介します。皮膚表面に限局した平坦な IH については、大きさや部位 によりレーザー療法の適応になります。症状に応じて専門医に紹介します。

単純性血管腫(毛細血管奇形 capillary malformation: CM)のうち、サーモンパッチは 1 歳半頃までに自然消退します。ウンナ母斑は発症率 $20\sim30\%$ と比較的高頻度にみられ、 消退率は約50%といわれています。

太田母斑、色調の濃い異所性蒙古斑は、レーザー治療効果が高い乳児期早期に専門医に紹介します。

おむつかぶれ(おむつ皮膚炎、乳児寄生菌性紅斑)

汗、尿、便で長時間濡れた状態にあることが最大の原因です。おむつをこまめに取り替えるよう伝えます。市販のおしり拭きよりも、シャワー浴またはぬるま湯による臀部浴がよいこともあります。カンジダ皮膚炎を生じることもありますので、症状の変化に注意します。

目やに(眼脂)

生後間もなくから眼脂が続く場合には、鼻涙管閉塞の可能性があります。内眼部の下方、 眼窩下縁から鼻涙管下端(小鼻の方)へ向かって涙嚢の内容物を押し込む「涙嚢マッサー ジ」を行うことで、生後3か月までにほとんどが軽快します。

鼻づまり

乾燥する冬季には鼻づまりの訴えが多くなります。たて抱きをすると、呼吸が楽になることがあります。鼻汁吸引器を用いることもひとつの手段です。鼻汁が塊になって吸引できないときに、生理食塩水や母乳を鼻孔に2~3滴垂らしてみると、つまりが改善することもあります 440。

ゼイゼイする

哺乳後や啼泣後の吸気性喘鳴は、呼吸状態に問題なく体重増加が良好であれば、経過を みてよいでしょう。喘鳴が強く、体重増加不良がある場合は、喉頭軟化症なども考慮に入 れ精査を行います。

しゃっくり

しゃっくりは横隔膜のけいれんによる吸気と声門の急速な動きによって起こるミオクローヌス (不随意運動)の一種で、この時期の児によくみられます。哺乳後に胃が横隔膜を刺激してしゃっくりが多くなることがあります。しゃっくりが多くても、特に問題がなく、無理にとめる必要はないことを伝えます。

げっぷ・おなら・いきむ・うなる

生後3~4か月頃までの乳児は、喉頭蓋が高い位置にあるため、呼吸をしながら哺乳します。そのために哺乳時に空気を飲みこんでしまいやすく、これがげっぷやおなら、いきむ、うなるなどの原因になります。肩に赤ちゃんの頭を載せて背中を軽く叩く方法の他に、赤ちゃんを前傾姿勢にして背中を擦るのみでもげっぷを出すことができます(図9)。哺乳後に児が眠ってしまうとげっぷが出ないことが多いので、そのときは児の上半身を高めにして寝かせ、目覚めてからげっぷを出すように伝えます。

よく吐く

「吐く」という訴えには、嘔吐(急激に吐物が出る)と溢乳(だらだらと吐物が出る)があります。溢乳は、1か月頃の児にはよくみられます。母乳や人工乳の飲みすぎ、げっぷがうまく出せない、胃食道逆流症などで起こることがあります。口腔内の異常がなく、体重増加が良好であれば経過を観察します。繰り返す嘔吐については、肥厚性幽門狭窄症や胃軸捻転、水頭症、中枢神経系の異常などを念頭に置いて精査を行います。

図9 げっぷの出し方



肩に赤ちゃんの頭を載 せて背中を軽く叩く



あかちゃんを前傾姿勢 にして背中を擦る

おへそ

臍ヘルニアは1歳までに約80%が自然治癒します。圧迫固定による自然治癒率の改善は認めませんが、自然治癒の時期を早めるといわれています。また、臍の醜形予防として有効といわれています。臍肉芽腫にはステロイド外用薬の塗布または硝酸銀による焼灼が有効です。生後1か月の時点で、臍帯が脱落していない場合は、結紮を考慮します。

便の色

母乳栄養では黄色から黄緑色で、母乳中の脂肪分が白色の粒になって混じることがあります。人工栄養では便の色は濃く、ねっとりすることが多いようです。緑色の便は、便の回数が少ない場合や空気を多く飲み込んだ際にみられます。便の色調で問題となるのは、赤、黒、白や、それに近い色調を呈する場合で、受診を要します。便に少量の血液が混じる乳児直腸出血は、母乳栄養児に多くみられます。便色カードが1~3番であれば、速やかに精密検査を行います。

便が出づらい

器質的疾患 (Hirschsprung 病、低位鎖肛など) がないことを確認したうえで、2~3日 便が出なくても腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ心配ないことを伝えます。4 日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行います。綿棒刺激を行う場合には、肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

※「母乳性便秘」

母乳栄養の児、あるいは母乳中心の混合栄養の児では、乳児期早期に排便回数が少なく、 放置しておけば1週間便が出ないということがあります。便が出づらい、いきみが強い、排 便時に苦しむなどの様子がなく、機嫌も良く体重増加も良好で、排便回数が少ない割には便 量が少ないことが特徴です。このような現象は、母乳が効率よく吸収され、便の産生が少ないために起こると考えられており、「母乳性便秘」と呼ばれることもあります。母乳性便秘は、多くの場合、便量が増加する離乳中期頃に自然に軽快します。

向き癖・頭の変形

頚部の腫瘤(筋性斜頚)の有無を確認します。頭蓋縫合早期癒合症の可能性も考慮し観察します。また向き癖は、股関節脱臼や臼蓋形成不全を誘発しますので、注意が必要です。 母体内での体位や向き癖により引き起こされた位置的頭蓋変形症に対しては、寝かせる向きや抱っこする向きを変える、タミータイム tummy time (赤ちゃんが起きている時間に保護者などがみている環境でうつ伏せにする時間をつくる) などの提案をします。このような介入は日齢が早いほど効果的です。

旅行

里帰りなどやむを得ない事情がなければ、一般的には生後3か月以降を勧めます。真夏や真冬はなるべく避けるようにします。鉄道・飛行機の選択については、感染予防の観点から所要時間が短い方が望ましいでしょう。飛行機では、気圧の変化への対応(離着陸時の耳ぬき:水分を飲ませるなど嚥下を促す、おしゃぶりを吸わせる、児の耳に小指を入れ圧迫して離すポンピングなど)が必要になることがあります。自動車では、適切なチャイルドシートを装着し、悪路を避け最低2時間ごとの休憩を取りながら移動する。夏場の高温環境(熱中症、日焼け)への注意を怠らないようにする等の注意が必要です。

おしゃぶり

おしゃぶりの使用は、中耳炎の発症や、歯列不正、噛み合わせの悪化につながります。 また、乳房以外のもので「吸う」という欲求が満たされるため、哺乳不良につながること もあります ⁴⁵⁾。

湯ざまし、麦茶、果汁

カロリーのないもので空腹が満たされてしまうと、哺乳回数や摂取量が減少するため、 母乳や人工乳以外に湯ざましや麦茶を与える必要はありません。果汁の摂取は哺乳量の 減少につながります。過剰摂取により低栄養や肥満の原因になることもあります。生後 6 か月までは果汁を飲ませないよう伝えます。

赤ちゃんの泣き

赤ちゃんは、眠りがちだった産科入院中から一転して、退院後にはよく泣くようになります。まずは哺乳量の不足により児が飢餓感を感じている可能性はないかを確認します。 空腹と関係ないようであれば、バスタオルで脚以外を少しきつめにくるんで抱っこする 方法や、児をうつぶせにして腕に添わせるようにお腹あたりを手のひらで支える「コリック抱き」などを勧めてみます。母親の精神状態が不安定な場合にも、ちょっとした泣き声が気になることがあります。 育児の状況や手助けをしてくれる人がいるかなどを丁寧に聴取します。泣きやまずイライラするときには、深呼吸し、児を安全なところにひとまず寝かせたうえで一旦その場を離れる、イライラする気持ちを児にぶつけて激しく揺さぶらないことなど、赤ちゃんの泣きへの対処についてあらかじめ話しておくことは重要です。乳幼児揺さぶられ症候群(shaken baby syndrome: SBS)の予防にもつながります。

※「パープルクライング」

赤ちゃんの泣き方には以下の特徴があり、英語の頭文字をとって「パープルクライング」と呼びます。

Peak of crying (ピークがある) 生後 2 週頃からよく泣くようになり、2 か月頃がピーク Unexpected (予測できない) 泣きやんでもまたすぐ泣きだす、理由がよくわからない Resists soothing (なだめられない) 何をしても泣きやまないことがある Pain-like face (痛そうな表情) どこも悪くなくても痛そうな顔で泣く Long lasting (長く泣く) 心配になるくらい泣き続ける Evening (夕方) 午後から夕方にかけてよく泣く

お風呂・温泉

臍帯脱落後、臍が乾燥した時期には、お風呂に入ることができます。また、母親側の要因として、性器出血などがなくなった産後2~4週頃から一緒に入ることができます。酸性・アルカリ性が強い温泉(酸性泉、炭酸水素塩泉)、硫黄泉は皮膚に対する刺激が強いため、入浴は勧めません。また、お湯の温度が高すぎないよう注意するよう伝えます⁴⁶⁾。

外気浴と日光浴

児を外の空気に触れさせる外気浴は、新陳代謝を盛んにします。生後2週頃を目安に室内の窓を開けて外の空気に触れさせることから始め、徐々に時間を長くして外に連れ出すようにします。外気浴に慣れてきたら、生後1か月頃から日光浴を始めます。1日約20分を目安に太陽光を浴びることで、くる病の予防にもつながります。日光浴は手、足から始め、全身浴へと進めます。日焼け止めは生後1か月頃の児には使用しません。

※くる病の予防について

母乳育児の場合、生後6か月の時点で、ビタミンD欠乏の指摘もあることから、母乳育児を行っている場合は、適切な時期に離乳を開始し、ビタミンDの供給源となる食品を積極的に摂取するなど、進行を踏まえてそれらの食品を意識的に取り入れるよう伝えます⁴⁷。

暑さ寒さ対策

気温が高い環境で、エアコンや扇風機を使用することに問題はありません。扇風機を使用

する際には、児に風が直接当たらないように注意します。設定温度は外気温に関係なく、26 \sim 28 $^{\circ}$ 26 目安に調節するとよいでしょう。水分補給として新生児期に湯ざましやイオン飲料を与えることは、適切ではありません。気温が低い時期には室内の乾燥に注意し、湿度は $40\sim$ 60 $^{\circ}$ 60 $^{\circ}$ 8 目安に調節します。

第9章 その他

第1節 早産・低出生体重で生まれた児・保護者への配慮

早産・低出生体重児で"一般的な" 1か月児健診を受診するのは、後期早産児かつ/または、在胎週数に比べて出生体重が小さい児(small for gestational age: SGA)と推測されるため、後期早産児ならびに正期産 SGA 児への対応について記載します。なお、1か月児健診でほかの児と比較して我が子が小さいと不安に感じる保護者も少なくありません。早産・低出生体重で生まれた児の成長曲線については、厚生労働科学研究補助金「低出生体重児の成長・発達評価手法の確立のための研究」(代表:河野由美)を参考にして下さい 48)。

(1)後期早産児

後期早産児とは、在胎 34 週 0 日~36 週 6 日で出生した児で、1 か月児健診のころに出産予定日をむかえます。後期早産児の脳重量は、成熟新生児に比べて約 65~75%にとどまります $^{49)}$ 。つまり、残りの 25~35%の成長は、予定日までの $4 \sim 6$ 週間が必要であり、この期間に DHA (ドコサヘキサエン酸)、EPA (エイコサペンタエン酸)、コレステロールが胎児に移行し、それに伴って白質重量が増加します。子宮内で蓄積できなかった DHA、EPA、コレステロールなど神経発達に重要な成分は、母乳を介して受け取ることができます。鉄も妊娠後期に胎盤を通して胎児に与えられるため、後期早産児では乳児期前半に鉄欠乏に陥るリスクがあります。

後期早産児は、哺乳不良、低体温、感染症等の短期的リスクや、発達障害等の長期的なリスクが高いこともわかっており、健診する側にも配慮が必要です。成長・発達の評価には、修正月齢を用います。体格は出産予定日前後で生まれた児よりも小さいことが少なくありません。上述の成長曲線を参考にするか、修正月齢で評価することを保護者に伝えておきます(ただし、予防接種は暦年齢で生後2か月から開始します)。なお、在胎35週6日までに出生した児は、パリビズマブ(シナジス®)、ニルセビマブ(ベイフォータス®)の適応があります。

授乳に関する工夫

在胎 36 週くらいで出生した児は表 4 のような特徴があり、授乳のタイミングがわかりづらいことがあります。啼泣したタイミングでおむつを替えてから授乳しようと思っていると、おむつを替えたところでまた睡眠に入り授乳のタイミングを逃してしまうことも少な

くありません。眠りがちな場合は、そっと刺激をして起こしてから授乳するとともに、あらかじめ搾乳しておいた母乳をコップで補足することも有用です。予定日まではできるだけ児と一緒にいるように心がけ、スキンシップ(可能であれば素肌と素肌で)をとるように伝えます。そうすることで授乳のタイミングを見つけやすくなります。予定日くらいまでうまく直接授乳できない児も珍しくありません。このような場合、母乳分泌を維持できるよう搾乳に関する情報提供も必要です。

表 4 早産児の特徴

- ・覚醒時間が少ない
- ・覚醒時に敏感さ、応答性が弱い
- ・活動性が少ない反面、むずかりやすい
- ・睡眠~覚醒の周期が短い
- ・夜間、頻繁に目を覚ましてむずかる
- ・吸啜が弱く、したがって、頻回に栄養補給を要求する

(2) 正期産 SGA 児

SGA とは、『出生時の体重および身長がともに在胎週数相当の 10 パーセンタイル未満であること』と定義されています。

正期産で出生体重が 2,200 g 以上ある場合は、フォローアップの専門医師が継続して診療 することは少ないため、1 か月児健診において、児が SGA 性低身長にあてはまる (出生時の 体重および身長が在胎週数相当の 10 パーセンタイル未満で、かつどちらか一方が-2 SD 未満)かを確認しておきます。

通常の1か月児健診を受診する児は、出生体重も2,200g以上と推測され、上記以外には通常の1か月児健診と同様でよいと考えます。

後期早産児・正期産 SGA 児 共通

鉄欠乏について:母子ともに健康であれば、生後6か月までの発育に必要な鉄は、妊娠後期に母体から経胎盤的に児に供給されます。低出生体重児や早産児では、鉄が十分蓄えられずに出生するため、生後4~5か月から鉄欠乏性状態に陥りやすくなります。鉄欠乏は造血のみでなく乳児の神経発達予後にも影響するため、乳児期を通じて鉄欠乏にならないように、離乳食を開始する時期を遅らせないこと、ならびに、鉄分を多く含む食品(豚や鶏レバー、赤身の肉や魚、ほうれん草や小松菜、卵黄、納豆など)の摂取などについて、可能であれば1か月児健診で伝えておきます。

第2節 子ども医療電話相談事業 (#8000) の案内

こどもが休日や夜間に発熱など急な症状に見舞われた際に、保護者の方がどのように対処したらいいのか不安になり病院を受診すべきか判断に迷う場合があります。その時に利用できるのが、「子ども医療電話相談事業(#8000)」です。全国同一の短縮番号 #8000 をプッシュすることで、小児科医や看護師に電話で相談することができ、こどもの症状に応じた適切な対応についてアドバイスを受けることができます。対応時間は各都道府県により異なりますので、厚生労働省ホームページの「子ども医療電話相談実施状況」でご確認ください(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)。全国の実施状況、および#8000 事業の分析結果も掲載されています。発熱した、咳がひどい、嘔吐するなどこどもの症状に困った場合、病院を受診すべきか迷う場合などには、#8000 が利用できることをお伝えください。

親は、赤ちゃんの様子が「いつもと違う」と感じることができます。「いつもと違う」とは、いつものように哺乳ができない、お腹を空かして泣いている、睡眠が足りていないのではないか、顔色や手足の温かさはどうか、尿と便はどうかなど、日頃みている赤ちゃんの様子が違っていると、親が感じます。近年、1か月児健診までの新生児期の保護者が #8000 を利用されるケースが増える傾向にあります。産院や病院を退院されてから自宅での赤ちゃんの様子に不安が募り、病気ではなく育児に関する質問が多くなっています。また、かかりつけ医となる小児科を決められずに、どこを受診していいか迷っているとの相談もあります。1か月児健診時には、育児から病気のことまで何でも相談できるかかりつけ医となる小児科を決めておくことを勧めてください。

つながりにくい場合に「こどもの救急 ONLINE (日本小児科学会作成)」と「こども救急ガイドブック〜小児救急ハンドブック (都道府県作成)」も活用することを伝えてください。 受診の判断、家庭での療養についての説明があり、医療機関の情報も掲載されている場合があります。

第10章 チェックリスト

健診実施者が実施すべき健診項目を見落とさないようにするために、1 か月児健診身体診察用のチェックリストを作成しました(表 5)。当該マニュアルの一部として作成されているものなので、1 か月児健診に取り組む上での技術的支援としてご活用ください。なお、1 か月児健診自休は、令和 5 年 12 月 28 日にこども家庭庁から示された健康診査票等を活用して実施されています。

表5 1か月児健診 診察時チェックリスト

			健診票に記載されている項目		その他	判定	Ē
1.	身体的発育異常		体重増加不良				正常
2.	外表奇形						正常
3.	姿勢の異常						異常なし
4.	皮膚		黄疸		湿疹		異常なし
			血管腫		母斑		
			色素異常				
			その他				
5.	頭部		頭血腫		大泉門膨隆		異常なし
			頭囲拡大		向き癖(右・左)		
			小頭症		その他の所見()		
			縫合異常				
6.	顔		特異的顔貌		その他の所見()		異常なし
			目:白色瞳孔・角膜混濁・眼瞼の異常等				
			口:口唇裂・口蓋裂				
			耳:小耳症・副耳・耳瘻孔等				
7.	頚部		斜頚		その他の所見(異常なし
			その他の頚部腫瘤				
8.	胸部		胸郭の異常		努力呼吸(多呼吸・陥没呼吸)		異常なし
			呼吸の異常		その他の所見(
			心雑音				
			不整脈				
9.	腹部・腰背部		臍:肉芽・ヘルニア		腹部膨満		異常なし
			腹部腫瘤		皮膚洞(毛巣洞)		
			そけいヘルニア		肛門の異常		
			仙骨部の異常	_	その他の所見(
10.	四肢		四肢の運動制限		上・下肢の異常		異常なし
			内反足	-	その他の所見(
11.	神経学的異常		モロー反射		引き起こし反射(低下・亢進)		異常なし
		-	筋トーヌス		その他の所見(
12.	発育性股関節形成不全リスク因子	l	股関節開排制限				異常なし
		l	大腿/そけい皮膚溝の非対称				
		l	家族歷				
		l	女児				
			骨盤位分娩				
13.	その他の異常			1	停留精巣(右・左)		異常なし
				1	陰嚢水腫(右・左)		
					その他の所見()		
14.	新生児聴覚検査						正常 □ 未
							精査中(右・左)
					サイトメガロウイルス検査(実施・未)		
-	先天性代謝異常等検査の結果説明			_			済 □ 未
16.	便色カード					1 ·	2・3・4・5・6・7 番
				無色	・薄い黄色・濃い黄色・茶褐色・その他		
17.	ビタミンK2の投与						できている
		1		1			できていない

参考文献

- 1) Tokumitsu K, Sugawara N, Maruo K, et al. Prevalence of perinatal depression among Japanese women: a meta-analysis. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:41.
- 2) Tokumitsu K, Sugawara N, Maruo K, et al. Prevalence of perinatal depression among Japanese men: a meta-analysis. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:65.
- 3) 「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(厚生労働省 速報値) https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf (参照 2024-10-11)
- 4) 福井聖子, 三瓶舞紀子, 金川 武司, 他. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に寄せられる新生児の相談と育児不安の検討. 母子衛生 2017;58:185-191.
- 5) 厚生労働省. 2022 (令和4) 年 国民生活基礎調査の概況 6.貧困率の状況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf (参照 2024-10-11)
- 6) こども家庭庁. こども虐待による死亡事例等の検証結果等について (第 20 次報告). https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/hogojirei/20-houkoku (参照 2024-10-11)
- 7) 乳幼児身体発育 評価マニュアル 令和3年3月改訂. 平成23年度 厚生労働科学研 究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
- 8) 水野克己. 新版 お母さんがもっと元気になる乳児健診—健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック. メディカ出版, 2021
- 9) 改訂版乳幼児健康診査 身体診察マニュアル. 平成30年度~令和2年度厚生労働科学研究補助金(成育疾患克服等次世代育成総合研究事業) https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf(参照2024-9-29)
- 10) 乳幼児身体発育曲線の活用・実践ガイド. 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業) https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/jissen_2021_03.pdf(参照 2024-9-29)
- 11) 令和 2 年度版 鳥取県乳幼児健康診査マニュアル,スタッフ用.鳥取県母子保健対策協議会,鳥取県健康対策協議会母子保健対策専門委員会. https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/249478/r2 compressed.pdf (参照 2024-9-29)
- 12) 赤ちゃんの股関節脱臼. 日本小児整形外科学会. http://www.jpoa.org/8041/(参照 2024-9-29)
- 13) 乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング等の効果的実施に関する研究. 平成 27 年度 日本医療研究開発機構研究費 (成育疾患克服等総合研究事業) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kenshintebiki.pdf (参照 2024-10-11)

- 14) 阪下和美. Bright Futures の考え方 バイオサイコソーシャルモデルの視点から. 小児 内科 2019: 51:1731-1735.
- 15) 乳幼児健診における虐待への気づき. 子ども虐待診療の手引き (第3版). 日本小児科学会, 2022年. https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20220328_g_tebiki_3.pdf (参照 2024-10-20)
- 16) 子どもとメディアの問題に対する提言. 日本小児科医会, 2004年. https://www.jpa-web.org/about/organization chart/cm committee.html (参照 2024-10-20)
- 17) Moubareck CA. Human milk microbiota and oligosaccharides: A glimpse into benefits, diversity, and correlations. Nutrients 2021;13(4):1123.
- 18) Yorifuji T, Tsukahara H, Doi H. Breastfeeding and risk of Kawasaki Disease: A nationwide longitudinal survey in Japan. Pediatrics 2016;137:e20153919.
- 19) Yamakawa M, Yorifuji T, Kato T, et al. Breast-feeding and hospitalization for asthma in early childhood: a nationwide longitudinal survey in Japan. Public Health Nutr 2015;18(10):1756-61.
- 20) Nishimura T, Suzue J, Kaji H. Breastfeeding reduces the severity of respiratory syncytial virus infection among young infants: A multi-center prospective study. Pediatr Int 2009;51:812-6.
- 21) Yamakawa M, Yorifuji T, Kato T, et al. Long-term effects of breastfeeding on children's hospitalization for respiratory tract infections and diarrhea in early childhood in Japan. Matern Child Health J 2015;19(9):1956-1965.
- 22) Jackson KM and Nazar AM. Breastfeeding, the immune response, and long-term health. J Am Osteopath Asoc. 2006;106:203-207.
- 23) Del Ciampo LA nadDel Ciampo IRL. Breastfeeding and the benefits of lactation for women's health. Rev Bras Ginecol Obstet 2018;40:354-359.
- 24) 仁志田博司. 第 15 章 栄養・消化器系の基礎と臨床. 高橋尚人 豊島勝昭編. 新生児学入門第 6 版. 医学書院, 2024:278.
- 25) 三川 宏. 臨床応用における体温計測の問題点(2) 新生児・小児の体温計測. BME 1998; 2:199-200.
- 26) 大石 彰.「乳幼児健診アップデート〜小児科と眼科の連携」新生児・乳児の視覚スク リーニング 産科クリニック乳児健診での導入を目指して. 眼科臨床紀要 2023;16 巻:62-367.
- 27) 福永道郎. 特集子どもの眠り ライフサイクルと睡眠. 小児内科 2017;49:1096-1100.
- 28) 新小田春美. お母さんに伝えてあげたい眠育ですくすく子育て. ペリネイタルケア 2012;31:86-91.
- 29) 渡辺綾子, 田中秀樹. 妊婦に対する妊娠中における睡眠教育による産後の不眠、睡眠満足度、抑うつの変化. こころの健康 2018;33:40-51.
- 30) 星野恭子. 特集 育児相談 Q&A 各論: 3~6 歳 昼寝は必要?. 小児内科 2022;54:996-998.

- 31) Ford B, Lara S, Park J. Heart Murmurs in Children: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2022 Mar 1;105(3):250-261.
- 32) 日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方. 公益社団法人日本小児科学会. http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/doji_sessyu20201112.pdf (参照 2024-10-17)
- 33) 日本におけるニルセビマブの使用に関するコンセンサスガイドライン.公益社団 法人日本小児科学会.
 - https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20240522Beyfortus GL.pdf(参照 2024-10-17)
- 34) 妊婦に接種するRSウイルスワクチンについて. 公益社団法人日本産婦人科学会. https://www.jsog.or.jp/news/pdf/infection03.pdf (参照 2024-10-17)
- 35) RSウイルス母子免疫ワクチンに関する考え方. 公益社団法人日本小児科学会. https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20240221_RWvirus_kangae.pdf (参照 2024-10-17)
- 36) Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry. 1987;150:782-6.
- 37) O'Connor E, Rossom RC, Henninger M, et al. Primary Care Screening for and Treatment of Depression in Pregnant and Postpartum Women: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2016;315(4):388-406.
- 38) Postpartum Depression: Action Towards Causes and Treatment (PACT) Consortium. Heterogeneity of postpartum depression: a latent class analysis. Lancet Psychiatry. 2015;2(1): 59-67.
- 39) 日本産婦人科医会. 「母と子のメンタルヘルスケア」. https://mcmc.jaog.or.jp/
- 40) 岡野禎治,村田真理子,増地聡子ほか.日本版エジンバラ産後うつ病自己評価票(EPDS) の信頼性と妥当性. 精神科診断学 1996;7(4):25-533.
- 41) 周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド 2023. 日本周産期メンタルヘルス学会. http://pmhguideline.com/consensus_guide2023/consensus_guide2023.html (参照 2024-8-29)
- 42) 妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル〜産後ケアへの切れ目のない支援に向けて〜 改訂版.公益社団法人日本産婦人科医会(令和3年4月)令和2年度厚生労働科学 研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代 育成総合研 究事業))
- 43) Yamamoto-Hanada K, Kobayashi T, Williams HC, et al. Early aggressive intervention for infantile atopic dermatitis to prevent development of food allergy: a multicenter, investigatorblinded, randomized, parallel group controlled trial (PACI Study)-protocol for a randomized controlled trial. Clin Transl Allergy. 2018;8:47.
- 44) 水野克己. 新版 お母さんがもっと元気になる乳児健診:健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック.メディカ出版,2020.

- 45) 落合聡. 子どもと家族の個性と育ちを支える 日常診療のアドバイスポイント 子ども の口. 総合小児医療カンパニア 乳幼児を診る一根拠に基づく育児支援. 中山書店, 2015.
- 46) 1か月健診ガイドブック改訂2版:山口県小児科医会,2017.
- 47) 厚生労働省. 授乳・離乳の支援ガイド 2019. https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000496257.pdf(参照 2024-10-20)
- 48) 日本新生児成育医学会. 令和4年度厚生労働科学研究費補助金 (疾病・障害対策研究分野 成育疾患克服等次世代育成基盤研究) 低出生体重児の成長・発達評価手法の確立のための研究 (研究代表者 河野由美)
 - $https://sukoyaka21.cfa.go.jp/media/tools/s03_mijyu_tebi002.pdf(参照 \ 2024-10-21)$
- 49) Kinney HC. The near-term (late preterm) human brain and risk for periventricular leukomalacia: a review. Semin Perinatol 2006;30:81-8.

執筆者・研究協力者・研究協力機関 一覧

研究代表者 永光信一郎

研究分担者	井上 建	内村直尚	岡明	岡田あゆみ	斉藤まなぶ
	榊原秀也	杉浦至郎	子吉知恵美	野邑健二	前垣義弘
	松浦賢長	三牧正和	山口 忍		
研究協力者	板野正敬	伊藤隆一	稲光 毅	岩本梨恵	馬詰 武
	岡 牧郎	小倉加恵子	金子淳子	北野久美	黒崎亜矢
	小枝達也	阪下和美	重安良恵	島袋林秀	鈴木俊治
	田原卓浩	星野恭子	堀内清華	松下 享	水野克己
	宮崎雅仁	守分 正	山口拓洋	和田雅樹	渡部誠一

研究協力機関

公益社団法人 日本小児科医会 公益社団法人 日本産婦人科医会 公益社団法人 日本小児科学会 公益社団法人 日本産科婦人科学会 公益社団法人 日本新生児成育医学会

山口県小児科医会

一般社団法人 日本外来小児科学会

公益社団法人 日本医師会 日本小児期外科系関連学会協議会 公益社団法人 日本小児保健協会 全国保健師長会 公益社団法人 日本看護協会

巻末資料

1か月児健康診査問診票

※問診票は、主にお子さんの世話をなさっている方が記入してください。

E B		本胎調数 () 温	
状態生時)重	
밁	_	お乳をよく飲みますか。	(はい・いいえ)
海 新兴:	2	元気な声で泣きますか。	(はい・いいえ)
的疾	က	大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。	(はい・いいえ)
₩€	4	お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。	(いいえ・はい)
) 禮 图	2	からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。	(いいえ・はい)
M	9	うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便(便色カード)番から3番)が続いていますか。	(いいえ・はい)
絥	7	あなたの顔をじっとみつめることがありますか。	(はい・いいえ)
抴	8	裸にすると手足をよく動かしますか。	(はい・いいえ)
	6	現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	(なし・あり(1日_本))
	10	10 現在、お子さんのお父さん(パートナー)は喫煙をしていますか。	(なし・あり(1日_本))
	=	11 窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。	(はい・いいえ)
親	12	, ソファやペッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか。	(はい・いいえ)
(4	13	13 あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)
H 🌣	14	赤ちゃんをいとおしいと感じますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)
養	15	子育てについて不安や困難を感じることはありますか。	(はい・いいえ・何ともいえない)
育	16	子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。	(はい・いいえ)
(中)	17	(きょうだいがいらっしゃる方へ)きょうだいのことで相談したいことはありますか。	(いいえ・はい)
かよ	18	お子さんのお母さんとお父さん(パートナー)は、協力し合って家事・育児をしていますか。	(そう思う・どちらかといえばそう思う・ どちらかといえばそう思わない・そう思わない)
育ての	19	お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことがありますか。	(いいえ・はい)
3 状况	20	現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。	(大変ゆとりがある・ややゆとりがある・普通・やや苦しい・ 大変苦しい)
	21	21 気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。	(いいえ・はい)
	22	物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。	(いいえ・はい)
	23	あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。	(いいえ・はい)
	24	24 あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。	(はい・いいえ)
接予種防	25	2か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。	(はい・いいえ)
健康和	誤(健康相談の内容	
指導内容	松		
特記事項	事項		

1か月児健康診査票

		体重	頭囲	栄養法	
	80	(田/宮 書加舞) &	83	母乳 混合 人工乳	
	身体的発育異常		8 腹部 腰背部	8	
	2 外表奇形 次数仓留单				イ 腹部腫瘤 ひ ケエンヘルニア
	4 皮膚	ア 黄疸			イ 化骨部の異常
		イ 血管腫ウ 色素異常	10 四肢		ア 四肢の運動制限 イ 内反足
	יי בא ליני	1 みの街	11 神経学的異常	完	ア モロー反射
		イ・関亜拡大け、小関係	12	発育性股関節形成不全リスク因子(アーキセルイかなナの2項目に)	別 久久 ア 投票 上 投票 投票 投票 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	9 顏	イ 4.9g元 エ 縫合異常 ア 特異的顔貌		ごうろ ジェ索 日 次十八	- 大殿 C. V. Xia A V. Yr Xivi ウ 家族歴 エ 女児
物数		イ 目:白色瞳孔・角腹眼の寒常等 ロ・口唇裂・口巻多	製品13 その他の異常	##F	才 肯盤位分娩
(下)		工 耳小耳症・副耳・	耳瘻孔等		
民	7 強部	ア 斜鎖 イ その他の頚部腫痛			
	8 胸部	ア 胸部の異常イ 呼吸の異常	114	新生児聴覚検査 先天性代謝異常等検香の結果説明	正常 精査中(右左) 未浴 未
		ウが維	91		(
	4	- 1	17 ビタミンK ₂ の	投与	できている ・ できていない
	判定 1 異常なし 2 既医療 3 要経過観察	深			
	4 要紹介(要精密·要治療)				
	紹介先				
	診査医名				
育児環境等	ア 母の心身状態 イ その他				
心配事	無-有(
米繊	良要指導				
育て支援の必 特に問題なし	子育て支援の必要性の判定 1 特に問題なし 2 保健師による支援が必要				
の他の	3 その他の支援が必要(
判定者					
4					



令和6年度 こども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業

こどもの健やかな成長・発達のためのバイオサイコソーシャルの観点 (身体的・精神的・社会的な観点)からの切れ目のない支援の推進のための研究(研究代表者 永光信一郎)

> 研究協力機関:日本小児科医会 日本産婦人科医会 日本小児科学会 日本産科婦人科学会 日本新生児成育医学会