

第10章 医療機関の受診状況

1 過去1年間の医療機関の受診の有無と受診した傷病名〔複数回答〕


20歳以上の世帯員（2,658人）に、この1年間に病院や診療所を受診したか聞いたところ、「受診した」割合が90.3%、「受診していない」が9.1%となっている。（図Ⅱ-10-1）

また、「受診した」と回答した人（2,401人）に、どのような傷病で受診したかを聞いたところ、「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が34.2%、「高血圧症」が21.7%、「眼の病気」が20.2%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」が15.1%、「花粉症」が13.7%となっている。（図Ⅱ-10-2）

図Ⅱ-10-1 過去1年間の医療機関の受診の有無

図Ⅱ-10-2 受診した傷病名〔複数回答〕

（上位10位まで）



（注）※は、「アトピー性皮膚炎」以外の皮膚の病気を示している。

(1) 過去1年間の医療機関の受診の有無一性・年齢階級別

過去1年間に医療機関を受診した割合は、男性8割超、女性9割超

過去1年間の医療機関の受診の有無を性別でみると、「受診した」割合は、男性87.9%、女性93.0%となっている。

性・年齢階級別にみると、女性では、全ての年代で「受診した」割合が8割を超え（88.3%～96.0%）、30代及び50代以上では9割を超えている（90.8%～96.0%）。（表Ⅱ-10-1）

表Ⅱ-10-1 過去1年間の医療機関の受診の有無一性・年齢階級別

	総 数	受 診 し た	受 診 し て い ない	無 回 答
総数	100.0 (2,658)	<u>90.3</u>	9.1	0.6
男	100.0 (1,384)	<u>87.9</u>	11.6	0.5
20～29歳	100.0 (80)	78.8	20.0	1.3
30～39歳	100.0 (152)	84.2	15.8	—
40～49歳	100.0 (213)	84.0	15.5	0.5
50～59歳	100.0 (310)	84.2	15.5	0.3
60～69歳	100.0 (256)	90.6	9.4	—
70～79歳	100.0 (233)	94.0	5.6	0.4
80歳以上	100.0 (140)	95.7	2.1	2.1
女	100.0 (1,272)	<u>93.0</u>	6.3	0.7
20～29歳	100.0 (103)	<u>88.3</u>	10.7	1.0
30～39歳	100.0 (148)	<u>93.9</u>	6.1	—
40～49歳	100.0 (182)	<u>89.6</u>	10.4	—
50～59歳	100.0 (258)	<u>94.2</u>	5.8	—
60～69歳	100.0 (195)	<u>90.8</u>	9.2	—
70～79歳	100.0 (225)	<u>96.0</u>	2.7	1.3
80歳以上	100.0 (161)	<u>95.7</u>	1.2	3.1

(2) 過去1年間の医療機関の受診の有無－かかりつけ医の有無別

過去1年間に医療機関を受診した割合は、かかりつけ医ありで9割超

過去1年間の医療機関の受診の有無をかかりつけ医の有無別でみると、「受診した」割合は、かかりつけ医ありで95.0%、かかりつけ医なしで75.6%となっている。(表Ⅱ-10-2)

表Ⅱ-10-2 過去1年間の医療機関の受診の有無－かかりつけ医の有無別

	総 数	受 診 し た	受 診 し て い ない	無 回 答
総数	100.0 (2,457)	91.0	8.5	0.4
かかりつけ医あり	100.0 (1,939)	<u>95.0</u>	4.6	0.4
かかりつけ医なし	100.0 (492)	<u>75.6</u>	24.2	0.2

(3) 受診した傷病名〔複数回答〕一性・年齢階級別

受診した傷病は、「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が男性約3割、女性3割超

受診した傷病名を性別でみると、男性では、「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が31.5%、「高血圧症」が25.2%、「眼の病気」が19.2%、「脂質異常症（高コレステロール血症等）」が14.8%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」が14.0%となっている。

女性では、「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が36.9%、「眼の病気」が21.3%、「高血圧症」が18.1%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」が16.1%、「花粉症」が15.4%となっている。（表Ⅱ-10-3）

表Ⅱ-10-3 受診した傷病名〔複数回答〕一性・年齢階級別

	総数	内分泌・代謝障害	糖尿病	肥満症	脂質異常症 （高コレステロール血症等）	甲状腺の病気	精神・神経	うつ病やその他のこころの病気	認知症	パーキンソン病	その他の神経の病気 （神経痛・麻痺等）	眼・耳	眼の病気	耳の病気	循環器系	高血圧症	脳卒中（脳出血、脳梗塞等）	狭心症・心筋梗塞	その他の循環器系の病気	呼吸器系	急性鼻咽頭炎（かぜ）	アレルギー性鼻炎 （アレルギー性鼻炎）	慢性閉塞性肺疾患 （COPD）	喘息	花粉症	その他の呼吸器系の病気	消化器系	胃・十二指腸の病気	肝臓・胆のうの病気	その他の消化器系の病気
総数	100.0 (2,401)	22.5	8.5	1.5	13.6	3.8	7.7	5.2	0.8	0.3	1.4	24.3	20.2	6.6	27.4	21.7	2.0	3.1	4.4	34.0	15.1	9.1	0.5	4.1	13.7	3.7	10.3	5.8	1.7	4.2
男	100.0 (1,216)	24.3	11.2	2.1	14.8	2.5	6.7	4.3	0.5	0.5	1.5	23.0	19.2	6.5	32.2	25.2	2.5	4.9	5.4	30.5	14.0	7.8	0.6	3.2	12.1	3.4	10.3	5.4	2.1	3.9
20～29歳	100.0 (63)	3.2	-	-	-	3.2	4.8	4.8	-	-	-	11.1	6.3	4.8	1.6	-	-	-	1.6	39.7	20.6	9.5	-	3.2	22.2	1.6	7.9	1.6	-	6.3
30～39歳	100.0 (128)	7.0	0.8	0.8	3.9	1.6	10.2	9.4	-	-	0.8	14.1	9.4	6.3	3.1	2.3	-	-	0.8	46.1	33.6	12.5	-	3.1	13.3	2.3	5.5	3.1	1.6	1.6
40～49歳	100.0 (179)	8.9	1.7	1.1	7.3	1.1	8.4	5.0	-	-	3.4	17.9	12.3	6.1	12.8	10.1	-	-	2.8	37.4	19.0	7.3	-	2.8	15.1	1.7	4.5	3.4	0.6	0.6
50～59歳	100.0 (261)	25.3	10.3	3.8	17.6	2.7	4.6	4.6	-	-	-	14.2	11.1	3.4	30.3	22.2	1.9	3.8	5.4	31.8	15.7	5.7	0.8	3.4	11.5	5.0	12.3	6.5	3.4	5.4
60～69歳	100.0 (232)	37.9	16.4	3.9	25.0	3.4	7.3	5.2	0.4	0.4	1.3	24.1	21.6	5.2	44.4	36.6	3.0	7.8	2.6	22.4	8.2	7.3	-	5.2	8.6	3.0	8.6	3.9	2.2	3.4
70～79歳	100.0 (219)	34.2	21.5	1.4	16.4	2.7	6.4	1.4	1.4	1.4	2.3	37.4	31.5	11.0	53.9	42.5	4.6	9.1	11.4	23.7	7.3	8.7	1.4	1.8	10.5	3.7	14.6	7.8	2.7	5.5
80歳以上	100.0 (134)	29.9	14.9	-	16.4	2.2	5.2	0.7	1.5	1.5	2.2	35.8	35.1	9.0	47.8	37.3	6.0	8.2	10.4	24.6	3.0	6.7	1.5	2.2	11.9	4.5	15.7	9.0	2.2	5.2
女	100.0 (1,183)	20.7	5.7	0.9	12.4	5.2	8.7	6.2	1.1	0.2	1.4	25.6	21.3	6.7	22.4	18.1	1.4	1.3	3.3	37.6	16.1	10.4	0.3	5.1	15.4	4.1	10.4	6.2	1.2	4.4
20～29歳	100.0 (91)	5.5	-	2.2	2.2	2.2	17.6	16.5	-	-	1.1	14.3	7.7	7.7	1.1	-	-	-	1.1	56.0	35.2	16.5	-	3.3	17.6	3.3	4.4	3.3	1.1	1.1
30～39歳	100.0 (139)	8.6	2.2	0.7	2.2	5.0	12.2	9.4	-	-	2.9	18.0	10.8	9.4	4.3	2.2	0.7	-	1.4	48.2	26.6	16.5	0.7	5.0	22.3	4.3	9.4	5.8	-	4.3
40～49歳	100.0 (163)	9.2	0.6	-	2.5	6.7	6.7	6.1	-	-	0.6	16.0	13.5	4.9	7.4	4.3	0.6	0.6	1.8	54.0	28.8	15.3	-	9.2	22.7	4.9	12.3	7.4	1.2	4.3
50～59歳	100.0 (243)	17.7	5.8	0.8	11.1	4.1	8.6	7.0	0.4	-	1.2	21.0	17.3	4.5	15.6	12.3	1.2	1.2	2.5	37.4	18.1	7.4	-	4.5	16.5	2.1	9.5	5.3	1.6	3.7
60～69歳	100.0 (177)	24.9	6.2	-	18.6	4.0	5.1	5.1	-	-	0.6	32.2	27.1	9.0	25.4	22.0	-	1.1	2.8	33.9	10.2	10.7	-	5.6	15.8	4.0	10.2	7.9	1.1	3.4
70～79歳	100.0 (216)	35.6	9.7	2.3	22.2	7.9	5.1	3.2	0.5	-	1.4	32.9	29.2	5.6	40.7	34.3	4.2	2.3	3.2	28.7	4.6	7.4	0.9	4.6	11.1	5.1	13.9	8.3	1.4	6.5
80歳以上	100.0 (154)	31.8	11.7	0.6	19.5	4.5	11.7	1.3	7.1	1.3	1.9	39.0	35.7	7.8	48.7	39.6	1.9	2.6	9.7	16.9	1.9	4.5	0.6	2.6	3.9	5.2	9.7	3.2	1.3	5.8
令和元年度	100.0 (4,792)	18.6	8.3	1.5	9.3	2.6	7.8	5.2	1.3	0.4	1.5	22.2	18.5	6.1	23.6	18.2	1.8	3.2	3.3	34.6	18.9	8.3	0.4	3.3	13.7	3.3	11.7	6.1	2.3	4.4

（注1）※1、2及び3は、令和元年度調査では選択肢を設けていなかった。

（注2）※4及び5は、令和元年度調査では「その他」の中に選択肢を設けていた。

（注3）※6は、令和元年度調査では「尿路生殖器系」の中に選択肢を設けていた。

（注4）※7は、令和6年度調査では選択肢を設けていない。

歯	歯の病気 （虫歯を含む）	皮膚	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚の病気	筋骨格系											婦人科・産科系※1						閉経期又は閉経後障害 （更年期障害等）※6	損傷											無回答
						痛風	関節リウマチ	関節症	肩こり症	腰痛症	骨粗しょう症	尿路生殖器系	腎臓の病気	前立腺肥大症	乳腺の病気※2		子宮・卵巣の病気※3	不妊症※4	（切迫流産、前置胎盤等）※5	骨折	骨折以外のけが・やけど			その他	貧血	血液の病気	悪性新生物（がん）	その他	不明※7					
34.2	34.2	14.5	3.1	11.7	18.4	2.6	1.2	4.2	2.7	8.0	4.0	5.8	2.7	3.5	7.1	1.2	4.0	0.4	1.0	1.5	6.5	2.9	4.0	10.2	1.7	0.4	3.0	5.5	…	6.0				
31.5	<u>31.5</u>	13.3	3.0	10.8	15.8	4.9	0.9	3.0	2.1	7.5	0.7	9.7	3.6	6.7	0.2	0.1	-	0.2	-	-	5.4	2.5	3.3	8.8	0.9	0.3	3.2	4.5	…	6.9				
23.8	23.8	20.6	6.3	17.5	1.6	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	3.2	1.6	14.3	1.6	-	-	12.7	…	12.7				
22.7	22.7	14.1	3.9	10.9	10.9	3.9	-	-	3.1	5.5	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	3.1	5.5	5.5	-	-	0.8	4.7	…	13.3				
21.8	21.8	14.5	4.5	10.1	8.9	3.4	-	1.1	0.6	4.5	-	1.7	1.1	0.6	0.6	-	-	0.6	-	-	3.9	0.6	3.4	10.1	0.6	0.6	0.6	8.4	…	12.3				
28.7	28.7	10.7	3.1	8.4	13.0	6.9	1.1	3.1	2.3	3.1	0.4	5.7	3.1	3.4	0.4	0.4	-	0.4	-	-	6.9	3.8	3.4	8.4	0.4	0.4	2.3	5.4	…	5.0				
27.6	27.6	14.7	2.2	12.5	15.9	5.2	0.9	4.3	1.7	6.0	-	10.3	3.9	6.9	-	-	-	-	-	-	5.6	2.6	3.4	6.9	0.9	-	3.0	3.0	…	3.9				
43.8	43.8	13.2	1.4	11.9	25.6	5.9	1.8	3.7	1.4	13.7	1.8	16.9	5.5	13.2	-	-	-	-	-	-	3.2	1.8	1.4	8.2	0.9	-	6.4	1.4	…	3.7				
48.5	48.5	10.4	2.2	8.2	25.4	4.5	1.5	6.7	5.2	17.2	3.0	28.4	9.0	20.1	-	-	-	-	-	-	6.0	2.2	4.5	12.7	3.0	1.5	7.5	1.5	…	5.2				
36.9	<u>36.9</u>	15.6	3.2	12.5	21.0	0.2	1.4	5.4	3.5	8.5	7.3	1.8	1.7	0.1	14.3	2.4	8.1	0.7	2.0	3.0	7.6	3.2	4.6	11.7	2.5	0.5	2.8	6.4	…	5.1				
27.5	27.5	17.6	5.5	12.1	4.4	-	-	1.1	1.1	2.2	-	-	-	-	15.4	-	12.1	-	3.3	-	4.4	-	4.4	17.6	5.5	-	-	12.1	…	7.7				
35.3	35.3	18.0	5.8	12.2	5.8	-	0.7	1.4	2.9	1.4	-	-	-	-	28.1	2.2	16.5	4.3	12.2	-	5.0	1.4	3.6	17.3	5.0	0.7	1.4	10.8	…	6.5				
40.5	40.5	19.6	6.7	13.5	16.6	-	1.8	4.9	6.7	4.9	-	1.8	1.8	-	25.2	3.1	13.5	1.2	2.5	8.0	6.1	1.8	4.3	11.0	3.1	-	0.6	7.4	…	6.7				
31.7	31.7	18.5	2.5	16.0	12.3	-	1.2	3.7	2.5	5.3	1.6	1.2	1.2	-	17.7	2.5	9.5	-	-	8.6	9.1	3.3	6.2	9.9	1.6	0.4	1.6	7.0	…	5.3				
37.9	37.9	11.9	0.6	11.3	25.4	-	0.6	8.5	1.7	10.2	9.6	1.7	1.7	-	5.6	2.8	2.3	-	-	0.6	8.5	4.0	5.1	13.6	0.6	2.3	6.2	5.6	…	4.0				
42.6	42.6	12.0	1.9	10.2	37.5	0.9	1.9	7.9	5.1	17.1	15.3	2.3	2.3	-	6.9	2.3	4.6	-	-	0.5	9.7	5.6	4.6	7.9	1.9	-	4.6	2.3	…	4.2				
39.6	39.6	13.0	1.9	11.0	35.1	-	3.2	7.8	3.2	13.0	20.8	4.5	3.9	0.6	4.5	2.6	1.9	-	-	-	7.1	3.9	3.2	9.7	2.6	-	3.2	3.9	…	2.6				
37.3	37.3	15.6	3.2	12.6	18.6	2.1	1.4	4.2	3.5	8.9	2.9	5.1	2.0	2.7	…	…	…	0.6	1.5	0.5	6.1	2.5	3.7	12.2	1.6	0.5	2.5	5.9	0.4	6.4				

2 最も気になる傷病

(1) 最も気になる傷病一性・年齢階級別

最も気になる傷病は、男性では「高血圧症」の割合が9.5%、女性では「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が7.7%となっている。

受診した傷病の中で最も気になる傷病名を性別でみると、男性では、「高血圧症」の割合が9.5%、「歯の病気（虫歯を含む）」が7.3%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」が5.6%となっている。

女性では、「歯の病気（虫歯を含む）」が7.7%、「高血圧症」が7.4%、「眼の病気」が5.3%となっている。

性・年齢階級別にみると、「高血圧症」が60代男性で17.2%、80歳以上の女性で16.9%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」が20代及び30代の男性でそれぞれ14.3%、16.4%、20代女性で14.3%、「歯の病気（虫歯を含む）」が30代男性で13.3%、20代女性で13.2%となっている。（表Ⅱ-10-4）

表Ⅱ-10-4 最も気になる傷病一性・年齢階級別

	総数	内分泌・代謝障害					甲状腺の病気					精神・神経					眼・耳					循環器系					呼吸器系					消化器系				
		糖尿病	肥満症	脂質異常症 （高コレステロール血症等）			うつ病やその他のこころの病気	認知症	パーキンソン病	その他の神経の病気 （神経痛・麻痺等）		眼の病気	耳の病気		高血圧症	脳卒中（脳出血、脳梗塞等）	狭心症・心筋梗塞	その他の循環器系の病気		急性鼻咽頭炎（かぜ）	アレルギー性鼻炎	慢性閉塞性肺疾患 （COPD）	喘息	花粉症	その他の呼吸器系の病気		胃・十二指腸の病気	肝臓・胆のうの病気	その他の消化器系の病気							
総数	100.0 (2,401)	9.7	4.2	0.2	4.0	1.3	3.7	2.5	0.3	0.2	0.7	6.6	5.2	1.4	13.0	8.4	0.7	1.7	2.1	13.6	5.2	2.1	0.2	1.5	3.0	1.5	3.9	1.9	0.6	1.4						
男	100.0 (1,216)	10.0	5.3	0.2	4.0	0.4	3.5	2.1	0.2	0.4	0.7	6.7	5.1	1.6	15.6	9.5	0.9	2.6	2.6	12.7	5.6	2.0	0.4	1.5	2.0	1.2	4.5	2.1	1.1	1.3						
20～29歳	100.0 (63)	1.6	-	-	-	1.6	1.6	-	-	-	7.9	3.2	4.8	1.6	-	-	-	1.6	27.0	14.3	3.2	-	-	9.5	-	4.8	1.6	-	3.2							
30～39歳	100.0 (128)	4.7	0.8	0.8	2.3	0.8	7.0	6.3	-	-	0.8	4.7	3.1	1.6	-	-	-	-	27.3	16.4	4.7	-	1.6	3.9	0.8	3.1	1.6	-	1.6							
40～49歳	100.0 (179)	3.9	0.6	-	3.4	-	5.6	3.4	-	-	2.2	7.8	7.3	0.6	7.8	6.1	-	-	1.7	17.9	10.1	1.7	-	1.7	3.4	1.1	2.2	1.7	-	0.6						
50～59歳	100.0 (261)	10.7	4.2	-	5.7	0.8	1.9	1.9	-	-	-	4.6	4.2	0.4	14.6	10.0	0.8	1.5	2.3	13.0	6.5	1.1	0.4	2.3	0.8	1.9	5.4	2.7	1.5	1.1						
60～69歳	100.0 (232)	16.4	9.9	0.9	5.2	0.4	3.4	1.7	0.4	0.4	0.9	7.8	6.0	1.7	24.6	17.2	1.7	4.3	1.3	7.8	0.9	2.2	-	1.7	0.9	2.2	5.6	2.2	1.3	2.2						
70～79歳	100.0 (219)	13.2	9.1	-	4.1	-	3.2	0.9	0.5	0.9	0.9	9.1	5.5	3.7	26.0	11.9	0.9	5.9	7.3	4.6	-	1.4	1.4	0.5	0.9	0.5	4.1	1.8	1.8	0.5						
80歳以上	100.0 (134)	9.0	6.0	-	3.0	-	1.5	-	-	1.5	-	5.2	4.5	0.7	17.2	9.0	2.2	3.7	2.2	6.0	0.7	1.5	0.7	1.5	0.7	0.7	6.0	3.0	1.5	1.5						
女	100.0 (1,183)	9.6	3.0	0.3	4.1	2.2	4.1	2.8	0.4	0.1	0.8	6.5	5.3	1.2	10.3	7.4	0.6	0.8	1.6	14.5	4.9	2.3	0.1	1.6	4.0	1.7	3.2	1.6	0.1	1.5						
20～29歳	100.0 (91)	2.2	-	2.2	-	-	11.0	9.9	-	-	1.1	7.7	4.4	3.3	1.1	-	-	-	1.1	23.1	14.3	2.2	-	-	5.5	1.1	-	-	-	-						
30～39歳	100.0 (139)	3.6	2.2	-	0.7	0.7	7.2	5.0	-	-	2.2	2.2	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	-	23.0	6.5	5.8	-	1.4	7.9	1.4	2.2	1.4	-	0.7							
40～49歳	100.0 (163)	6.7	0.6	-	1.2	4.9	2.5	2.5	-	-	-	4.9	4.3	0.6	3.1	1.2	-	0.6	1.2	21.5	8.6	3.7	-	1.2	5.5	2.5	6.1	3.1	-	3.1						
50～59歳	100.0 (243)	10.7	2.9	-	5.8	2.1	2.9	2.1	-	-	0.8	4.9	4.5	0.4	9.1	6.2	0.4	0.8	1.6	14.8	6.6	1.2	-	2.1	4.9	-	2.9	1.2	-	1.6						
60～69歳	100.0 (177)	12.4	4.0	-	6.8	1.7	2.3	2.3	-	-	-	12.4	10.2	2.3	9.6	8.5	-	0.6	0.6	12.4	2.8	2.3	-	1.1	4.0	2.3	4.5	2.3	0.6	1.7						
70～79歳	100.0 (216)	14.4	4.6	0.5	5.6	3.7	2.8	1.9	0.5	-	0.5	8.3	6.9	1.4	17.1	13.0	1.4	1.4	1.4	7.4	0.5	0.5	-	2.8	1.4	2.3	2.3	1.4	-	0.9						
80歳以上	100.0 (154)	10.4	5.2	-	4.5	0.6	4.5	-	2.6	0.6	1.3	4.5	4.5	-	24.7	16.9	1.3	1.3	5.2	6.5	-	1.9	0.6	1.3	-	2.6	3.2	1.3	-	1.9						
令和元年度	100.0 (4,792)	8.5	4.4	0.2	2.8	1.1	4.3	2.8	0.5	0.3	0.7	5.7	4.5	1.2	11.9	7.7	1.1	1.8	1.4	12.7	5.1	1.4	0.2	1.3	3.4	1.4	4.7	2.0	0.8	1.8						

（注1）※1、2及び3は、令和元年度調査では選択肢を設けていなかった。

（注2）※4及び5は、令和元年度調査では「その他」の中に選択肢を設けていた。

（注3）※6は、令和元年度調査では「尿路生殖器系」の中に選択肢を設けていた。

（注4）※7は、令和6年度調査では選択肢を設けていない。

歯	歯の病気 （虫歯を含む）	皮膚			筋骨格系	痛風	関節リウマチ	関節症	肩こり症	腰痛症	骨粗しょう症	尿路生殖器系	腎臓の病気	前立腺肥大症	婦人科・産科系※1	乳腺の病気※2	子宮・卵巣の病気※3	不妊症※4	妊娠・産褥 （切迫流産、前置胎盤等）※5	閉経期又は閉経後障害 （更年期障害等）※6	損傷	骨折	骨折以外のけが・やけど	その他	貧血	血液の病気	悪性新生物（がん）	その他	不明※7	無回答
		アトピー性皮膚炎	その他の皮膚の病気																											
7.5	7.5	4.7	1.0	3.7	6.7	0.7	0.6	1.2	0.6	2.3	1.2	2.7	1.4	1.4	3.1	0.6	1.3	0.1	0.4	0.6	2.1	0.7	1.4	6.0	0.3	0.2	1.9	3.6	...	16.6
7.3	7.3	4.9	1.2	3.7	5.0	1.4	0.5	0.8	0.2	2.0	0.1	4.9	2.2	2.7	-	-	-	-	-	-	1.6	0.7	1.0	6.2	0.3	0.2	2.2	3.4	...	17.1
4.8	4.8	14.3	1.6	12.7	1.6	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1.6	1.6	11.1	-	-	-	11.1	...	20.6
13.3	13.3	9.4	1.6	7.8	5.5	2.3	-	-	-	3.1	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.6	0.8	3.9	-	-	0.8	3.1	...	18.0
10.6	10.6	8.4	3.4	5.0	3.4	1.1	-	0.6	-	1.7	-	1.7	1.1	0.6	-	-	-	-	-	-	2.8	0.6	2.2	6.7	-	-	0.6	6.1	...	21.2
8.4	8.4	5.4	1.5	3.8	5.7	3.4	-	0.8	0.8	0.8	-	4.6	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-	2.7	1.5	1.1	5.7	0.4	0.4	0.8	4.2	...	17.2
3.9	3.9	2.2	-	2.2	3.9	0.9	0.9	1.7	0.4	-	-	4.7	2.2	2.6	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.9	5.6	0.4	-	3.0	2.2	...	13.4
5.9	5.9	1.4	0.5	0.9	6.4	0.5	1.4	-	-	4.1	0.5	7.8	2.7	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	0.5	-	3.7	0.5	...	13.7
4.5	4.5	0.7	-	0.7	6.7	-	0.7	2.2	-	3.7	-	11.9	5.2	6.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.7	9.7	0.7	1.5	6.0	1.5	...	20.9
7.7	7.7	4.5	0.8	3.7	8.4	0.1	0.7	1.7	0.9	2.6	2.4	0.5	0.5	-	6.3	1.2	2.7	0.3	0.8	1.3	2.5	0.8	1.8	5.8	0.3	0.2	1.5	3.8	...	16.1
13.2	13.2	7.7	3.3	4.4	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	7.7	-	6.6	-	1.1	-	3.3	-	3.3	5.5	1.1	-	-	4.4	...	16.5
9.4	9.4	7.9	1.4	6.5	2.2	-	0.7	-	0.7	0.7	-	-	-	-	14.4	0.7	6.5	2.2	5.0	-	1.4	-	1.4	8.6	-	0.7	0.7	7.2	...	16.5
7.4	7.4	5.5	1.8	3.7	6.7	-	1.8	-	2.5	2.5	-	1.2	1.2	-	12.3	0.6	5.5	-	1.2	4.9	3.1	1.2	1.8	3.7	0.6	-	-	3.1	...	15.3
9.9	9.9	6.6	0.4	6.2	6.6	-	0.4	2.5	1.2	1.6	0.8	-	-	-	7.0	1.2	2.9	-	-	2.9	2.1	-	2.1	7.8	0.4	0.4	1.2	5.8	...	14.8
6.8	6.8	2.8	-	2.8	9.6	-	-	3.4	0.6	3.4	2.3	-	-	-	1.7	1.1	0.6	-	-	-	3.4	0.6	2.8	6.8	-	-	4.0	2.8	...	15.3
6.0	6.0	0.9	-	0.9	14.4	0.5	0.9	2.8	0.9	4.2	5.1	1.4	1.4	-	1.9	1.9	-	-	-	-	2.8	1.9	0.9	3.7	-	-	2.3	1.4	...	16.7
3.2	3.2	1.9	-	1.9	13.0	-	0.6	1.3	-	3.9	7.1	0.6	0.6	-	1.9	1.9	-	-	-	-	1.9	1.3	0.6	4.5	0.6	-	1.3	2.6	...	18.8
8.5	8.5	4.3	1.4	2.9	7.3	0.6	0.9	1.8	0.6	2.8	0.7	2.3	1.1	0.8	...	...	...	0.3	0.7	0.3	1.7	0.6	1.1	7.5	0.5	0.3	2.2	3.5	0.1	20.6

3 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地

(1) 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[病院]一地域別

全ての二次保健医療圏で、居住地の属する圏域内の病院を受診した割合が最も高く、区中央部、区南部、区西部、区東部、西多摩及び北多摩西部では4割を超えている

最も気になる傷病を回答した人(2,002人)が受診した病院の所在地を地域別にみると、全ての地域で、居住地の属する二次保健医療圏内で受診した割合が最も高く、区中央部、区南部、区西部、区東部、西多摩及び北多摩西部に居住する人では、4割を超えている(42.2%~50.0%)。
(表Ⅱ-10-5)

表Ⅱ-10-5 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[病院]一地域別

病院 所在地 受診者の 居住地域	総 数	都 内															都 外	無 回 答
			区 部 計	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	市 町 村 部 計	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部		
総数	100.0 (2,002)	51.1	37.5	7.3	4.0	4.9	5.5	7.3	3.6	4.8	13.6	2.0	4.2	2.7	3.0	1.6	1.8	47.1
区部 計	100.0 (1,374)	52.3	51.4	9.8	5.7	6.4	7.1	10.1	5.3	7.0	0.9	－	－	0.1	0.5	0.3	1.6	46.1
区中央部	100.0 (120)	60.8	60.8	<u>50.0</u>	1.7	3.3	3.3	－	1.7	0.8	－	－	－	－	－	－	－	39.2
区南部	100.0 (165)	48.5	47.9	3.0	<u>42.4</u>	1.8	0.6	－	－	－	0.6	－	－	－	－	0.6	1.2	50.3
区西南部	100.0 (200)	50.0	49.5	7.0	2.0	36.0	4.0	－	－	0.5	0.5	－	－	0.5	－	－	2.0	48.0
区西部	100.0 (161)	54.7	50.9	3.7	－	2.5	<u>42.2</u>	1.9	0.6	－	3.7	－	－	－	2.5	1.2	－	45.3
区西北部	100.0 (343)	52.2	51.0	6.7	0.9	0.9	3.5	38.2	0.6	0.3	1.2	－	－	－	0.9	0.3	0.9	46.9
区東北部	100.0 (177)	46.3	46.3	5.6	－	－	－	2.3	36.7	1.7	－	－	－	－	－	－	5.6	48.0
区東部	100.0 (208)	55.8	55.8	7.7	－	1.0	1.9	0.5	1.4	<u>43.3</u>	－	－	－	－	－	－	1.4	42.8
市町村部 計	100.0 (628)	48.6	7.0	1.9	0.2	1.6	2.2	1.1	－	－	41.6	6.4	13.5	8.6	8.6	4.5	2.4	49.0
西多摩	100.0 (78)	56.4	1.3	－	－	－	1.3	－	－	－	55.1	<u>47.4</u>	2.6	3.8	1.3	－	1.3	42.3
南多摩	100.0 (206)	47.6	4.9	1.9	－	1.5	1.5	－	－	－	42.7	－	39.8	2.4	0.5	－	4.9	47.6
北多摩西部	100.0 (104)	54.8	4.8	1.9	－	－	2.9	－	－	－	50.0	2.9	－	<u>42.3</u>	1.9	2.9	1.9	43.3
北多摩南部	100.0 (156)	43.6	9.6	3.2	－	3.8	2.6	－	－	－	34.0	－	0.6	0.6	32.1	0.6	1.3	55.1
北多摩北部	100.0 (84)	45.2	15.5	1.2	1.2	1.2	3.6	8.3	－	－	29.8	－	－	1.2	－	28.6	－	54.8
令和元年度	100.0 (3,804)	49.8	35.1	7.5	3.5	3.7	6.3	5.4	4.2	4.5	14.7	1.2	4.9	2.6	4.0	2.0	2.2	48.0

(2) 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地〔診療所〕―地域別

全ての二次保健医療圏で、居住地の属する圏域内の診療所を受診した割合が最も高く、いずれも4割を超えている

最も気になる傷病を回答した人(2,002人)が受診した診療所の所在地を地域別にみると、全ての地域で、居住地の属する二次保健医療圏内で受診した割合が最も高く、いずれも4割を超えている(45.8%~67.9%)。(表Ⅱ-10-6)


表Ⅱ-10-6 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地〔診療所〕―地域別

診療所 所在地 受診者の 居住地域	総 数	都 内															都 外	無 回 答
			区 部 計	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	市 町 村 部 計	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部		
総数	100.0 (2,002)	61.0	41.6	5.2	4.9	6.3	6.3	8.7	4.6	5.5	19.4	2.6	6.1	3.2	4.9	2.5	0.8	38.2
区部 計	100.0 (1,374)	59.1	58.7	7.2	7.1	8.7	8.4	12.5	6.8	7.9	0.4	-	-	-	0.2	0.2	0.5	40.4
区中央部	100.0 (120)	52.5	52.5	<u>45.8</u>	-	1.7	1.7	0.8	1.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	47.5
区南部	100.0 (165)	60.0	60.0	0.6	<u>58.8</u>	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	39.4
区西南部	100.0 (200)	60.5	60.5	4.5	-	<u>53.0</u>	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5
区西部	100.0 (161)	68.3	67.1	3.1	0.6	3.7	<u>58.4</u>	0.6	0.6	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	31.7
区西北部	100.0 (343)	58.0	56.9	3.2	-	0.9	3.5	<u>49.0</u>	0.3	-	1.2	-	-	-	0.3	0.9	0.6	41.4
区東北部	100.0 (177)	57.6	57.6	5.6	-	0.6	-	1.1	<u>49.2</u>	1.1	-	-	-	-	-	-	0.6	41.8
区東部	100.0 (208)	56.7	56.7	3.8	-	-	1.0	-	1.0	<u>51.0</u>	-	-	-	-	-	-	1.4	41.8
市町村部 計	100.0 (628)	65.1	4.3	1.0	-	1.1	1.6	0.5	-	0.2	60.8	8.4	19.4	10.2	15.3	7.5	1.4	33.4
西多摩	100.0 (78)	70.5	1.3	-	-	-	1.3	-	-	-	69.2	<u>67.9</u>	-	1.3	-	-	-	29.5
南多摩	100.0 (206)	63.6	1.9	1.5	-	-	0.5	-	-	-	61.7	-	<u>59.2</u>	2.4	-	-	2.9	33.5
北多摩西部	100.0 (104)	59.6	3.8	1.0	-	1.0	1.9	-	-	-	55.8	-	-	<u>54.8</u>	1.0	-	1.0	39.4
北多摩南部	100.0 (156)	67.3	7.7	0.6	-	3.8	3.2	-	-	-	59.6	-	-	-	<u>59.0</u>	0.6	-	32.7
北多摩北部	100.0 (84)	66.7	7.1	1.2	-	-	1.2	3.6	-	1.2	59.5	-	-	1.2	3.6	<u>54.8</u>	2.4	31.0
令和元年度	100.0 (3,804)	63.0	42.4	6.8	4.7	5.4	6.5	7.5	4.9	6.5	20.6	1.4	6.6	3.7	5.7	3.2	1.5	35.5

4 医療情報の入手方法[複数回答]

20 歳以上の世帯員（2,658 人）に、医療情報をどのように入手しているか聞いたところ、「テレビ・ラジオ」の割合が 37.2%、「医療機関のホームページ」が 35.9%、「友人・知人からの情報」が 29.2%となっている。（図Ⅱ-10-3）

図Ⅱ-10-3 医療情報の入手方法[複数回答]



(注1) *は、令和元年度調査では選択肢を設けていなかった。

(注2) ※1の「上記以外」とは「医療機関のホームページ」、「医療情報ネット(ナビイ)」、「医師会のホームページ」、「福祉医療機構の福祉・保健・医療の情報サイト「WAM NET」」、「日本医療機能評価機構の医療情報サービス「Minds」」を示している。

(注3) ※2は、令和元年度調査では「SNS(ツイッター、フェイスブック等)・ブログ・掲示板」としていた。

(注4) ※3は、令和元年度調査では「健康関連の本」と「雑誌の特集記事」に選択肢を分けていた。

(注5) ※4は、令和元年度調査では「東京都医療機関案内サービス「ひまわり」」としていた。

(1) 医療情報の入手方法[複数回答]－性・年齢階級別

医療情報の入手方法は、「テレビ・ラジオ」の割合が、男性3割超、女性約4割

医療情報の入手方法を性別でみると、「テレビ・ラジオ」の割合は、男性 35.0%、女性 39.6% となっている。

性・年齢階級別にみると、20代～30代男性及び20代～40代女性では「SNSや上記以外のインターネット情報」の割合が4割を超えている（42.3%～49.5%）。70代以上の男性及び70代女性では、「新聞」の割合が3割を超えている（30.7%～34.8%）（表Ⅱ-10-7）

表Ⅱ-10-7 医療情報の入手方法[複数回答]－性・年齢階級別

	総 数	健康 関連 の本・ 雑誌	新聞	テレビ・ ラジオ	東京 都や 市区 町村 等の 広報 紙	医療 機関 のホ ーム ペー ジ	「医療 情報 ネット （ナビ イ）」	医師 会 のホ ーム ペー ジ	福祉 医療 情報 サ ー ビ ス （ W A M N E T ）	日本 医療 機能 評価 機構 の 医 療 情 報 サ ー ビ ス （ M i n d s ）	S N S や 上 記 以 外 の イ ン タ ー ネ ッ ト 情 報	その 他 の イ ン タ ー ネ ッ ト 等	医師 から の 情 報	友人・ 知人 から の 情 報	保健 所・保 健セ ンター などの 公的 な相 談機 関	東京都 医療機 関案内 サービス 「ひま わり」 （電話 案内）	その他	特に ない	無回 答
総数	100.0 (2,658)	9.8	16.3	37.2	18.1	35.9	2.8	2.0	0.9	0.5	28.3	0.5	25.3	29.2	2.9	0.8	1.8	9.1	1.5
男	100.0 (1,384)	9.5	16.8	<u>35.0</u>	16.7	34.8	3.0	1.8	0.8	0.7	27.7	0.4	24.4	24.5	2.7	0.7	1.6	11.2	1.4
20～29歳	100.0 (80)	10.0	6.3	16.3	11.3	36.3	1.3	2.5	1.3	1.3	<u>43.8</u>	－	7.5	28.8	－	－	－	13.8	3.8
30～39歳	100.0 (152)	4.6	4.6	25.7	3.9	38.8	2.6	3.3	0.7	0.7	<u>42.8</u>	0.7	11.2	22.4	0.7	0.7	0.7	15.1	1.3
40～49歳	100.0 (213)	8.5	9.4	35.7	8.9	40.4	1.4	1.4	0.5	0.5	35.7	0.5	14.1	23.5	1.4	0.9	1.9	8.9	0.5
50～59歳	100.0 (310)	6.8	9.4	29.7	10.6	42.3	3.5	3.2	1.0	0.3	28.1	0.3	23.5	22.9	3.2	0.6	1.6	14.5	0.6
60～69歳	100.0 (256)	9.8	16.8	38.3	15.6	41.4	3.1	0.4	0.4	－	27.0	0.4	26.6	23.0	2.0	－	1.6	10.5	0.4
70～79歳	100.0 (233)	12.0	<u>34.8</u>	46.4	30.9	22.7	6.4	0.4	1.3	1.3	17.6	0.4	36.9	28.8	4.7	0.4	0.9	7.3	1.7
80歳以上	100.0 (140)	17.1	<u>33.6</u>	42.1	37.1	12.1	－	2.1	0.7	1.4	7.1	－	41.4	25.0	5.7	2.1	4.3	9.3	5.0
女	100.0 (1,272)	10.1	15.7	<u>39.6</u>	19.7	37.1	2.5	2.2	1.0	0.3	28.9	0.6	26.3	34.4	3.1	1.0	2.0	6.9	1.5
20～29歳	100.0 (103)	6.8	1.0	27.2	4.9	42.7	2.9	4.9	1.9	－	<u>49.5</u>	－	10.7	31.1	－	－	1.0	7.8	1.0
30～39歳	100.0 (148)	8.1	2.7	28.4	4.1	55.4	2.0	2.7	－	－	<u>46.6</u>	－	16.2	25.7	2.0	－	0.7	6.8	－
40～49歳	100.0 (182)	6.6	6.6	30.8	11.0	52.2	2.7	4.4	1.1	0.5	<u>42.3</u>	－	23.6	29.7	4.4	1.1	2.7	5.5	－
50～59歳	100.0 (258)	11.2	12.8	38.8	17.1	53.5	3.1	2.3	1.6	0.8	38.4	0.8	23.3	34.9	3.5	1.6	1.9	3.5	－
60～69歳	100.0 (195)	12.8	19.0	53.3	27.2	33.8	3.1	1.5	1.5	0.5	22.1	－	26.2	41.0	3.6	1.0	2.1	6.2	1.5
70～79歳	100.0 (225)	13.8	30.7	46.7	37.3	16.9	2.7	0.9	0.9	－	10.7	0.9	39.1	43.1	3.1	1.3	1.8	8.4	1.3
80歳以上	100.0 (161)	7.5	27.3	42.9	23.6	5.6	0.6	－	－	－	3.1	1.9	36.0	29.2	3.7	1.2	3.1	12.4	7.5
令和元年度	100.0 (5,627)	20.6	15.5	31.8	13.1	…	…	6.5	3.8	1.2	16.9	9.3	31.1	39.0	4.0	4.5	3.4	13.1	4.3

(2) 医療情報の入手方法[複数回答]一かかりつけ医の有無別

医療情報の入手方法が「医師からの情報」の割合は、かかりつけ医ありの人の方が、かかりつけ医なしの人より高い

医療情報の入手方法をかかりつけ医の有無別にみると、「医師からの情報」の割合は、かかりつけ医ありの人では 28.9%、かかりつけ医なしの人では 12.6%と、かかりつけ医ありの人の方が 16.3 ポイント高くなっている。一方、「SNS や上記以外のインターネット情報」の割合は、かかりつけ医ありの人では 26.8%、かかりつけ医なしの人では 38.4%と、かかりつけ医なしの人の方が 11.6 ポイント高くなっている。(表Ⅱ-10-8)


表Ⅱ-10-8 医療情報の入手方法[複数回答]一かかりつけ医の有無別

	総数	健康関連の本・雑誌	新聞	テレビ・ラジオ	東京都や市区町村等の広報紙	医療機関のホームページ	「医療情報ネット(ナビイ)」	医師会のホームページ	福祉医療機構の福祉・保健・医療の情報サイト「WAMNET」	日本医療機能評価機構の医療情報サービス「Minds」	SNS や上記以外のインターネット情報	その他のインターネット等	医師からの情報	友人・知人からの情報	保健所・保健センターなどの公的な相談機関	東京都医療機関案内サービス「ひまわり」(電話案内)	その他	特になし	無回答
総数	100.0 (2,457)	9.8	16.6	38.0	18.2	36.6	2.8	2.0	0.9	0.4	28.9	0.4	25.7	29.6	3.0	0.9	1.8	8.7	1.2
かかりつけ医あり	100.0 (1,939)	10.0	18.4	39.9	20.3	35.7	2.9	1.9	1.1	0.4	<u>26.8</u>	0.5	<u>28.9</u>	30.6	3.2	0.9	1.8	7.8	1.3
かかりつけ医なし	100.0 (492)	8.7	9.1	30.9	10.0	40.4	2.6	2.4	0.2	0.6	<u>38.4</u>	0.2	<u>12.6</u>	25.6	2.0	0.8	2.0	11.6	0.4

5 医療機関を選ぶために欲しい医療情報〔複数回答〕

20歳以上の世帯員（2,658人）に、病院や診療所などの医療機関を選ぶために欲しい情報はどのような情報か聞いたところ、「診療日・診療時間」の割合が68.1%、「かかりたい医療機関の所在地・連絡先等」が65.2%、「実施している手術・治療の内容や件数等の診療実績」が33.4%となっている。（図Ⅱ-10-4）

図Ⅱ-10-4 医療機関を選ぶために欲しい医療情報〔複数回答〕



(1) 医療機関を選ぶために欲しい医療情報[複数回答]一性・年齢階級別

医療機関を選ぶために欲しい情報は、「診療日・診療時間」の割合が、男性では6割超、女性では約7割

医療機関を選ぶために欲しい情報を性別でみると、「診療日・診療時間」の割合は、男性 65.1%、女性 71.4%、「かかりたい医療機関の所在地・連絡先等」は、男性 60.8%、女性 69.8%となっている。(表Ⅱ-10-9)

表Ⅱ-10-9 医療機関を選ぶために欲しい医療情報[複数回答]一性・年齢階級別


	総 数	か か り た い 医 療 機 関 の 所 在 地 ・ 連 絡 先 等	診 療 日 ・ 診 療 時 間	医 師 ・ 看 護 師 な ど の ス タ フ の 人 数	医 師 ・ 歯 科 医 師 の 氏 名 ・ 略 歴 ・ 専 門 分 野 な ど	医 療 機 器 の 保 有 状 況	実 施 し て い る 手 術 ・ 治 療 の 内 容 や 件 数 等 の 診 療 実 績	連 携 し て い る 医 療 機 関 名	病 室 や 待 合 室 な ど の 施 設 設 備 の 快 適 さ	診 療 以 外 の サ ー ビ ス の 実 施 の 有 無 （ 人 間 ド ッ ク ・ 健 康 診 断 ・ 健 康 相 談 な ど ）	診 療 に か か る 自 己 負 担 の 額 （ 差 額 ベ ッ ド 代 な ど ）	評 価 機 構 な ど ） が 実 施 し た 病 院 の 評 価 結 果	基 本 方 針	運 営 方 針 や 患 者 サ ー ビ ス の 実 施 の 有 無 （ 医 療 費 や 診 療 内 容 に 関 す る こ と な ど ）	セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン 実 施 の 有 無	そ の 他	特 に な い	無 回 答
総数	100.0 (2,658)	65.2	68.1	12.1	31.1	15.1	33.4	24.8	17.8	10.6	21.9	15.2	10.2	12.9	18.1	3.1	9.7	1.7
男	100.0 (1,384)	60.8	65.1	11.2	27.9	14.4	30.3	21.5	14.9	9.2	19.8	13.9	8.4	10.0	16.2	3.0	11.3	1.9
20～29歳	100.0 (80)	53.8	77.5	11.3	32.5	17.5	21.3	15.0	12.5	7.5	28.8	8.8	12.5	7.5	5.0	7.5	12.5	3.8
30～39歳	100.0 (152)	60.5	79.6	10.5	27.0	15.8	28.3	11.8	15.8	7.9	17.1	11.8	12.5	5.9	8.6	3.9	8.6	1.3
40～49歳	100.0 (213)	67.6	77.5	12.2	29.1	11.3	23.5	16.9	17.8	5.6	22.5	11.7	10.8	6.6	14.1	3.3	8.5	0.9
50～59歳	100.0 (310)	60.6	71.3	8.7	28.4	12.9	25.8	18.4	14.8	9.0	16.1	12.3	7.1	7.1	15.2	2.3	12.9	0.6
60～69歳	100.0 (256)	67.6	71.1	12.9	32.4	18.0	34.8	27.0	14.5	8.2	18.4	20.7	7.8	10.9	21.9	3.1	5.9	0.8
70～79歳	100.0 (233)	56.2	45.1	11.2	28.3	15.0	41.2	29.6	15.5	13.7	19.3	15.0	6.0	15.9	21.0	1.3	15.5	2.6
80歳以上	100.0 (140)	50.7	32.1	12.9	14.3	11.4	32.1	25.7	10.7	12.1	25.0	11.4	5.7	15.7	17.9	3.6	17.9	6.4
女	100.0 (1,272)	69.8	71.4	13.1	34.4	16.0	36.7	28.4	21.0	12.2	24.2	16.7	12.2	16.0	20.2	3.1	8.0	1.6
20～29歳	100.0 (103)	71.8	83.5	11.7	24.3	9.7	43.7	6.8	24.3	7.8	33.0	11.7	12.6	7.8	7.8	4.9	6.8	1.0
30～39歳	100.0 (148)	77.7	86.5	12.8	32.4	17.6	36.5	21.6	29.1	12.2	28.4	12.8	12.8	8.1	11.5	4.7	3.4	0.7
40～49歳	100.0 (182)	80.2	86.3	14.3	37.4	16.5	33.0	26.4	18.1	9.9	22.0	13.2	10.4	12.6	17.0	4.4	3.3	－
50～59歳	100.0 (258)	77.1	86.0	13.6	46.1	20.9	42.2	32.2	22.5	10.5	20.2	22.9	14.0	14.3	24.0	3.5	2.7	－
60～69歳	100.0 (195)	68.7	67.7	12.8	39.5	15.9	45.6	34.9	19.0	12.8	25.1	19.0	13.8	18.5	28.7	2.6	4.1	1.5
70～79歳	100.0 (225)	60.9	53.8	13.8	30.2	16.9	36.0	36.4	20.0	18.2	28.9	22.2	14.2	27.6	28.9	1.8	14.2	2.2
80歳以上	100.0 (161)	51.6	38.5	11.2	20.5	8.7	18.0	25.5	16.1	11.2	16.1	7.5	5.6	16.1	11.2	0.6	23.0	6.2

第11章 がん医療・在宅療養・リハビリテーション医療・在宅医療

1 がん医療対策に望むこと〔複数回答〕

20歳以上の世帯員（2,658人）に、がん医療対策について、どういったことに力を入れてほしいと思うか聞いたところ、「高度ながん医療の提供（患者の病状にあわせ、高い水準で適切な治療が受けられるような体制の整備）」の割合が58.7%と最も高く、「がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実」が49.5%、「緩和ケアの充実」が46.9%となっている。（図Ⅱ-11-1）

図Ⅱ-11-1 がん医療対策に望むこと〔複数回答〕



(1) がん医療対策に望むこと[複数回答]一性・年齢階級別

がん医療対策に望むことは、男女とも「高度ながん医療の提供」の割合が約6割で最も高い

がん医療対策に望むことを性別でみると、男女とも「高度ながん医療の提供（患者の病状にあわせ、高い水準で適切な治療が受けられるような体制の整備）」の割合が最も高くなっている（男性 58.7%、女性 58.6%）。

「がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実」の割合は、男性 43.1%、女性 56.4%、「緩和ケアの充実」は、男性 39.1%、女性 55.3%、「住み慣れた家庭や地域で療養ができるような在宅医療体制の充実」は、男性 32.7%、女性 43.1%と、いずれも女性の方が10ポイント以上高くなっている。（表Ⅱ-11-1）


表Ⅱ-11-1 がん医療対策に望むこと[複数回答]一性・年齢階級別

	総数	高度ながん医療の提供（患者の病状にあわせ、高い水準で適切な治療が受けられるような体制の整備）	がん医療について専門的な知識を有する医師や看護師などの育成	がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実	緩和ケアの充実	がん医療に関する情報の提供	住み慣れた家庭や地域で療養ができるような在宅医療体制の充実	働きながら治療が可能な医療提供体制の整備、都民や企業等への理解促進	医療連携体制の整備	がん登録の推進	その他	特にない	無回答
総数	100.0 (2,658)	58.7	45.9	49.5	46.9	38.9	37.7	31.6	29.3	8.8	1.4	15.0	2.4
男	100.0 (1,384)	<u>58.7</u>	42.7	<u>43.1</u>	<u>39.1</u>	38.1	<u>32.7</u>	27.0	25.8	8.7	1.5	18.6	2.2
20～29歳	100.0 (80)	52.5	37.5	40.0	31.3	30.0	17.5	30.0	23.8	15.0	1.3	30.0	6.3
30～39歳	100.0 (152)	54.6	35.5	30.9	25.7	36.2	27.0	38.8	23.0	11.8	1.3	28.3	2.0
40～49歳	100.0 (213)	57.3	46.5	43.7	40.4	42.7	30.0	34.3	24.9	8.5	1.4	18.3	1.4
50～59歳	100.0 (310)	61.0	44.8	38.7	42.9	33.5	29.4	34.5	22.6	8.4	3.2	19.4	1.0
60～69歳	100.0 (256)	60.5	47.3	51.2	47.7	42.2	40.2	31.6	28.1	9.0	0.8	12.9	－
70～79歳	100.0 (233)	64.8	43.3	53.2	38.6	42.5	36.1	9.0	31.8	8.2	1.3	12.4	2.1
80歳以上	100.0 (140)	50.0	33.6	35.7	32.9	32.9	40.0	6.4	24.3	2.9	－	21.4	7.9
女	100.0 (1,272)	<u>58.6</u>	49.4	<u>56.4</u>	<u>55.3</u>	39.6	<u>43.1</u>	36.6	33.1	9.0	1.3	11.0	2.6
20～29歳	100.0 (103)	58.3	38.8	38.8	38.8	28.2	31.1	35.0	20.4	9.7	1.9	23.3	1.9
30～39歳	100.0 (148)	56.8	44.6	53.4	52.7	38.5	45.3	53.4	30.4	10.8	0.7	12.8	－
40～49歳	100.0 (182)	66.5	51.6	53.8	56.0	41.8	45.1	56.0	34.1	10.4	2.7	9.3	－
50～59歳	100.0 (258)	65.9	58.9	62.8	62.4	50.0	47.3	54.7	38.8	8.5	2.3	4.3	0.8
60～69歳	100.0 (195)	64.1	54.4	67.7	61.5	44.6	43.6	27.7	39.0	8.7	0.5	6.2	2.1
70～79歳	100.0 (225)	53.3	50.2	61.3	60.0	40.4	44.9	18.7	38.2	9.3	0.9	10.2	4.0
80歳以上	100.0 (161)	41.0	35.4	42.2	41.6	21.7	36.6	6.8	19.3	5.6	－	21.1	9.9

2 がんに関する相談内容[複数回答]

20歳以上の世帯員（2,658人）に、もしも、がんと診断された場合、専門の相談窓口へ相談したいと思うものを聞いたところ、「がんの治療法（体調に応じた治療方法や痛みへの対応、薬の副作用など）」の割合が81.9%と最も高く、次いで「治療費等の経済的負担」が65.5%、「医療機関の選び方」が49.5%となっている。（図Ⅱ-11-2）

図Ⅱ-11-2 がんに関する相談内容[複数回答]



(注1) ※1は、令和元年度調査では「がんの治療法」としていた。

(注2) ※2は、令和元年度調査では「専門的な医療を受けられる医療機関」としていた。

(注3) ※3は、令和元年度調査では「周囲の人への伝え方や相談の仕方」としていた。

(注4) ※4は、令和元年度調査では「医師や看護師等の医療者との関係」としていた。

(1) がんに関する相談内容[複数回答]一性・年齢階級別

がんと診断された場合に相談したい内容は、男女とも「がんの治療法」の割合が最も高い

もしも、がんと診断された場合、専門の相談窓口へ相談したいと思うものを性別でみると、男女とも「がんの治療法（体調に応じた治療方法や痛みへの対応、薬の副作用など）」の割合が最も高く（男性 80.7%、女性 83.1%）、次いで「治療費等の経済的負担」（男性 62.8%、女性 68.5%）となっている。また、「不安な気持ちへの対応」の割合は、男性 34.2%、女性 47.6%と、女性の方が 13.4 ポイント高くなっている。

性・年齢階級別にみると、男女とも 20 代～40 代では「仕事への影響」が 5 割を超えている（53.4%～65.0%）（表Ⅱ-11-2）

表Ⅱ-11-2 がんに関する相談内容[複数回答]一性・年齢階級別

	総数	がんの治療法（体調に応じた治療方法や痛みへの対応、薬の副作用など）	不安な気持ちへの対応	治療費等の経済的負担	家族や周囲の人への伝え方や相談の仕方	家事、子育て、介護	食事や運動など生活への影響	仕事への影響	医療機関の選び方	セカンドオピニオンの方法	医師や看護師等の医療従事者との関係	在宅療養を支えてくれる医療・介護施設	がんに関する情報の収集方法	その他	特にない	無回答
総数	100.0 (2,658)	81.9	40.6	65.5	20.0	15.5	28.4	36.2	49.5	34.8	16.2	28.3	28.5	0.7	6.1	2.1
男	100.0 (1,384)	<u>80.7</u>	<u>34.2</u>	<u>62.8</u>	19.8	13.4	25.7	38.4	45.2	31.3	12.9	23.0	24.9	0.5	7.5	2.0
20～29歳	100.0 (80)	71.3	41.3	62.5	31.3	18.8	35.0	<u>65.0</u>	36.3	18.8	10.0	16.3	20.0	1.3	12.5	3.8
30～39歳	100.0 (152)	79.6	36.2	66.4	28.3	28.9	32.2	<u>57.2</u>	38.2	23.7	15.1	16.4	23.0	0.7	10.5	1.3
40～49歳	100.0 (213)	78.9	38.5	64.3	25.4	22.1	28.6	<u>55.4</u>	39.0	32.9	13.6	18.3	26.3	-	8.5	0.5
50～59歳	100.0 (310)	81.6	34.2	67.7	15.2	13.9	25.8	47.7	44.5	36.1	10.6	19.4	23.5	0.6	6.5	1.0
60～69歳	100.0 (256)	85.5	34.0	61.7	16.8	6.6	22.7	36.7	52.7	37.5	11.7	25.4	27.7	-	3.9	-
70～79歳	100.0 (233)	83.3	33.5	59.7	19.7	6.4	26.6	12.0	53.2	30.9	13.7	33.0	28.8	1.3	6.0	3.4
80歳以上	100.0 (140)	75.0	22.9	52.9	11.4	3.6	12.9	2.9	42.1	22.9	17.1	28.6	19.3	-	11.4	7.9
女	100.0 (1,272)	<u>83.1</u>	<u>47.6</u>	<u>68.5</u>	20.1	17.8	31.4	33.6	54.0	38.5	19.7	34.0	32.3	0.9	4.6	2.1
20～29歳	100.0 (103)	74.8	51.5	63.1	24.3	19.4	37.9	<u>53.4</u>	37.9	27.2	14.6	16.5	28.2	-	10.7	1.9
30～39歳	100.0 (148)	85.8	54.1	75.7	27.0	37.2	31.8	<u>53.4</u>	48.6	33.1	18.2	25.7	28.4	-	5.4	-
40～49歳	100.0 (182)	84.6	46.7	81.3	19.8	29.7	33.0	<u>58.2</u>	56.0	39.6	18.7	33.5	40.1	1.1	3.8	-
50～59歳	100.0 (258)	88.0	52.7	77.9	17.4	17.4	34.9	49.2	61.2	50.0	22.5	34.1	39.9	0.8	1.9	0.8
60～69歳	100.0 (195)	90.3	45.1	65.1	17.9	10.8	33.8	19.0	65.1	44.6	21.5	36.9	33.8	1.0	2.1	1.0
70～79歳	100.0 (225)	80.9	44.9	64.0	21.8	9.3	24.9	8.0	55.6	42.7	23.1	42.7	30.7	1.8	3.6	3.1
80歳以上	100.0 (161)	70.8	39.1	46.0	16.1	6.2	25.5	3.7	39.8	18.0	14.3	37.9	18.0	0.6	9.3	8.7

3 在宅療養の理想とその実現可能性



20歳以上の世帯員（2,658人）に、脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要になった場合、理想として自宅で療養を続けたいと思うか聞いたところ、「そう思う」の割合が33.9%、「そう思わない」が27.6%、「わからない」が36.8%となっている。（図Ⅱ-11-3）

また、「そう思う」と回答した人（902人）に、実現可能だと思うか聞いたところ、「実現可能だと思う」の割合が33.3%、「実現は難しいと思う」が48.9%、「わからない」が17.0%となっている。（図Ⅱ-11-4）



図Ⅱ-11-3 在宅療養の理想

図Ⅱ-11-4 在宅療養の実現可能性

令和6年度



令和元年度



(1) 在宅療養の理想－性・年齢階級別


理想として自宅で療養を続けたいと「思う」人の割合は、男性約4割、女性約3割

在宅療養の理想を性別でみると、「そう思う」の割合は、男性38.7%、女性28.7%で、男性の方が10ポイント高くなっている。

性・年齢階級別にみると、「そう思う」の割合は、30代及び80歳以上の男性では42.1%となっている。

(図Ⅱ-11-5)

図Ⅱ-11-5 在宅療養の理想－性・年齢階級別




(2) 在宅療養の実現可能性－性・年齢階級別

理想として自宅で療養を続けたいと思う人のうち、在宅療養が「実現可能だと思う」の割合は、男女ともに3割超

在宅療養の実現可能性を性別でみると、理想として自宅で療養を続けたいと思う人のうち、「実現可能だと思う」の割合は、男性 33.6%、女性 32.6%となっている。

性・年齢階級別にみると、「実現は難しいと思う」の割合は、70代男性では60.0%となっている。(図Ⅱ-11-6)


図Ⅱ-11-6 在宅療養の実現可能性－性・年齢階級別



4 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]

在宅療養の実現は難しいと思う人（441人）に、その理由を聞いたところ、「家族に負担をかけるから」の割合が71.2%と最も高く、次いで「在宅医療や在宅介護でどのようなケアを受けられるかわからないから」が46.0%、「急に病状が変わったときの対応が不安だから」が44.9%となっている。（図Ⅱ-11-7）

図Ⅱ-11-7 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]



(1) 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]一性・年齢階級別

在宅療養の実現が難しいと思う理由は、男女とも「家族に負担をかけるから」の割合が約7割で最も高い

在宅療養の実現が難しいと思う理由を性・年齢階級別にみると、男女とも「家族に負担をかけるから」の割合が最も高くなっている（男性71.1%、女性71.3%）。（表Ⅱ-11-3）


表Ⅱ-11-3 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]一性・年齢階級別

	総 数	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由
	総 数	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由	在宅療 養の 実現が 難しい と思う 理由
総数	100.0 (441)	46.0	44.9	24.5	17.0	71.2	25.6	34.0	33.6	1.1	-	2.5
男	100.0 (266)	45.5	43.2	27.1	18.0	71.1	19.2	32.3	35.0	0.8	-	2.6
20～29歳	100.0 (12)	50.0	41.7	25.0	8.3	58.3	25.0	25.0	58.3	-	-	8.3
30～39歳	100.0 (30)	43.3	50.0	16.7	16.7	60.0	33.3	36.7	46.7	-	-	-
40～49歳	100.0 (39)	46.2	53.8	30.8	25.6	69.2	20.5	33.3	46.2	-	-	2.6
50～59歳	100.0 (70)	40.0	37.1	28.6	21.4	72.9	15.7	44.3	37.1	2.9	-	1.4
60～69歳	100.0 (44)	47.7	43.2	22.7	15.9	75.0	15.9	34.1	34.1	-	-	2.3
70～79歳	100.0 (51)	54.9	41.2	31.4	15.7	72.5	15.7	13.7	15.7	-	-	3.9
80歳以上	100.0 (20)	35.0	40.0	30.0	10.0	80.0	20.0	30.0	25.0	-	-	5.0
女	100.0 (174)	46.6	47.7	20.7	15.5	71.3	35.1	36.2	31.0	1.7	-	2.3
20～29歳	100.0 (10)	30.0	50.0	20.0	30.0	30.0	10.0	30.0	20.0	-	-	-
30～39歳	100.0 (24)	45.8	37.5	25.0	12.5	79.2	41.7	50.0	45.8	-	-	8.3
40～49歳	100.0 (23)	30.4	43.5	17.4	-	78.3	13.0	34.8	39.1	-	-	-
50～59歳	100.0 (34)	55.9	50.0	23.5	11.8	88.2	32.4	35.3	32.4	-	-	-
60～69歳	100.0 (23)	52.2	56.5	21.7	30.4	52.2	52.2	52.2	43.5	4.3	-	-
70～79歳	100.0 (36)	58.3	52.8	13.9	19.4	77.8	38.9	27.8	16.7	5.6	-	2.8
80歳以上	100.0 (24)	33.3	41.7	25.0	12.5	58.3	41.7	25.0	20.8	-	-	4.2


5 最期の過ごし方の希望

脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要になった場合、理想として自宅で療養を続けたいと思う人（902人）に、自分の最期をどのように過ごしたいか聞いたところ、「自宅で最後まで療養したい」の割合が36.1%、「自宅で療養して、最後は医療機関に入院したい」が29.7%、「自宅で療養して、必要になったら特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所したい」が18.1%となっている。（図Ⅱ-11-8）



図Ⅱ-11-3 在宅療養の理想



図Ⅱ-11-8 最期の過ごし方の希望



令和元年度



(1) 最期の過ごし方の希望－性・年齢階級別

理想として自宅で療養を続けたいと思う人のうち、「自宅で最後まで療養したい」の割合は、男女ともに3割超

最期の過ごし方の希望を性別でみると、理想として自宅で療養を続けたいと思う人のうち、「自宅で最後まで療養したい」の割合は、男性36.1%、女性36.2%となっている。

性・年齢階級別にみると、「自宅で最後まで療養したい」の割合は、40代女性では50.0%となっている。(表Ⅱ-11-4)

表Ⅱ-11-4 最期の過ごし方の希望－性・年齢階級別


	総数	自宅で最後まで療養したい	自宅で療養し、最後に医療機関に入院した	自宅に特別な介護保険施設に入所したい	その他	わからない	無回答
総数	100.0 (902)	36.1	29.7	18.1	0.9	12.3	2.9
男	100.0 (535)	<u>36.1</u>	31.0	16.6	0.7	12.5	3.0
20～29歳	100.0 (31)	35.5	22.6	22.6	3.2	16.1	－
30～39歳	100.0 (64)	34.4	20.3	20.3	1.6	23.4	－
40～49歳	100.0 (75)	37.3	28.0	16.0	－	18.7	－
50～59歳	100.0 (122)	45.1	24.6	18.0	1.6	9.0	1.6
60～69歳	100.0 (99)	31.3	38.4	12.1	－	12.1	6.1
70～79歳	100.0 (85)	34.1	37.6	17.6	－	8.2	2.4
80歳以上	100.0 (59)	28.8	42.4	13.6	－	5.1	10.2
女	100.0 (365)	<u>36.2</u>	27.9	20.0	1.1	12.1	2.7
20～29歳	100.0 (22)	40.9	9.1	22.7	－	27.3	－
30～39歳	100.0 (46)	32.6	23.9	19.6	－	21.7	2.2
40～49歳	100.0 (42)	<u>50.0</u>	21.4	21.4	－	7.1	－
50～59歳	100.0 (77)	36.4	37.7	11.7	1.3	11.7	1.3
60～69歳	100.0 (52)	28.8	21.2	30.8	1.9	11.5	5.8
70～79歳	100.0 (74)	29.7	27.0	25.7	2.7	10.8	4.1
80歳以上	100.0 (52)	42.3	38.5	11.5	－	3.8	3.8

6 リハビリテーションまたは在宅医療の利用状況〔複数回答〕


20歳以上の世帯員（2,658人）に、リハビリテーションまたは在宅医療を利用したことがあるか聞いたところ、リハビリテーションについては、「通所・通院リハビリテーション」を利用した割合が7.3%、「回復期リハビリテーション」が4.8%となっている。一方、「利用したことがない」は、85.6%となっている。（図Ⅱ-11-9）

また、在宅医療については、「訪問看護」を利用した割合が2.6%、「訪問診療」が2.3%となっている。一方「利用したことがない」は、85.5%となっている。（図Ⅱ-11-10）

図Ⅱ-11-9 リハビリテーションの利用状況〔複数回答〕



図Ⅱ-11-10 在宅医療の利用状況〔複数回答〕



(1) リハビリテーションの利用状況[複数回答]一性・年齢階級別

「通所・通院リハビリテーション」を利用した割合は、80歳以上の女性では1割超

リハビリテーションの利用状況を性・年齢階級別にみると、「回復期リハビリテーション」を利用した割合は、80歳以上では、男性10.0%、女性13.0%となっている。

「通所・通院リハビリテーション」を利用した割合は、80歳以上では、男女ともに9.3%となっている。(表Ⅱ-11-5)

表Ⅱ-11-5 リハビリテーションの利用状況[複数回答]一性・年齢階級別

	総 数	回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	通 所 ・ 通 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	で そ の 他 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 指 示 の も と 自 宅)	利 用 し た こ と が な い	無 回 答
総数	100.0 (2,658)	4.8	7.3	1.9	1.0	85.6	3.8
男	100.0 (1,384)	5.4	7.2	2.1	0.7	85.0	4.1
20～29歳	100.0 (80)	5.0	7.5	1.3	—	85.0	5.0
30～39歳	100.0 (152)	2.0	6.6	2.0	—	88.2	4.6
40～49歳	100.0 (213)	2.3	5.2	1.9	—	91.5	1.4
50～59歳	100.0 (310)	4.2	5.8	1.0	1.0	88.4	3.5
60～69歳	100.0 (256)	6.3	9.4	1.2	0.8	83.2	2.3
70～79歳	100.0 (233)	8.6	7.3	3.0	1.3	83.3	3.0
80歳以上	100.0 (140)	<u>10.0</u>	<u>9.3</u>	5.7	0.7	70.7	13.6
女	100.0 (1,272)	4.1	7.4	1.7	1.4	86.2	3.5
20～29歳	100.0 (103)	—	1.9	—	—	94.2	3.9
30～39歳	100.0 (148)	0.7	5.4	0.7	1.4	92.6	2.0
40～49歳	100.0 (182)	1.1	6.0	0.5	—	92.3	1.1
50～59歳	100.0 (258)	3.9	6.6	0.8	1.6	91.1	1.6
60～69歳	100.0 (195)	4.1	10.8	2.1	3.1	83.6	2.1
70～79歳	100.0 (225)	4.4	8.9	0.9	0.9	86.7	3.1
80歳以上	100.0 (161)	<u>13.0</u>	<u>9.3</u>	6.8	2.5	62.7	12.4

(2) 在宅医療の利用状況[複数回答]一性・年齢階級別

「訪問診療」「訪問看護」を利用した割合は、80歳以上の女性ではそれぞれ約1割

在宅医療の利用状況を性・年齢階級別にみると、「訪問診療」を利用した割合は、80歳以上では、男性4.3%、女性9.9%となっている。

「訪問看護」を利用した割合は、80歳以上では、男性6.4%、女性9.3%となっている。

(表Ⅱ-11-6)

表Ⅱ-11-6 在宅医療の利用状況[複数回答]一性・年齢階級別

	総 数	訪 問 診 療	訪 問 看 護	利 用 し た こ と が な い	無 回 答
総数	100.0 (2,658)	2.3	2.6	85.5	10.7
男	100.0 (1,384)	2.0	2.4	85.6	10.8
20～29歳	100.0 (80)	—	—	83.8	16.3
30～39歳	100.0 (152)	2.6	2.0	90.1	6.6
40～49歳	100.0 (213)	1.9	1.9	92.0	4.7
50～59歳	100.0 (310)	1.3	2.9	88.7	8.1
60～69歳	100.0 (256)	1.2	1.2	86.7	10.9
70～79歳	100.0 (233)	2.6	2.1	83.7	12.0
80歳以上	100.0 (140)	<u>4.3</u>	<u>6.4</u>	66.4	25.7
女	100.0 (1,272)	2.8	2.9	85.4	10.6
20～29歳	100.0 (103)	1.9	1.0	90.3	7.8
30～39歳	100.0 (148)	0.7	2.0	94.6	3.4
40～49歳	100.0 (182)	1.1	1.1	91.8	6.6
50～59歳	100.0 (258)	0.8	1.9	89.9	8.1
60～69歳	100.0 (195)	3.1	3.6	85.6	9.7
70～79歳	100.0 (225)	2.7	1.8	80.9	16.4
80歳以上	100.0 (161)	<u>9.9</u>	<u>9.3</u>	65.2	20.5

(3) 回復期リハビリテーションを利用した医療機関の所在地―地域別

「回復期リハビリテーション」を利用した医療機関の所在地は、「都内」が7割を超えている

回復期リハビリテーションを利用した人（127人）に、医療機関の所在地を聞いたところ、「都内」の割合が74.8%、「都外」が3.1%となっている。（表Ⅱ-11-7）

表Ⅱ-11-7 回復期リハビリテーションを利用した医療機関の所在地―地域別

医療機関 所在地 受診者の 居住地域	総 数	都 内															都 外	無 回 答
			区 部 計	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	市 町 村 部 計	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部		
総数	100.0 (127)	74.8	54.3	3.1	10.2	8.7	3.1	13.4	6.3	9.4	20.5	1.6	9.4	3.1	3.1	3.1	3.1	22.0
区部 計	100.0 (89)	75.3	73.0	3.4	14.6	12.4	4.5	15.7	9.0	13.5	2.2	-	-	-	1.1	1.1	2.2	22.5
区中央部	100.0 (6)	50.0	50.0	33.3	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
区南部	100.0 (13)	92.3	92.3	-	92.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-
区西南部	100.0 (16)	81.3	75.0	-	6.3	68.8	-	-	-	-	6.3	-	-	-	6.3	-	6.3	12.5
区西部	100.0 (6)	50.0	50.0	-	-	-	33.3	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
区西北部	100.0 (19)	73.7	73.7	5.3	-	-	5.3	63.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.3
区東北部	100.0 (11)	72.7	72.7	-	-	-	-	9.1	63.6	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3
区東部	100.0 (18)	77.8	72.2	-	-	-	5.6	-	-	66.7	5.6	-	-	-	-	5.6	-	22.2
市町村部 計	100.0 (38)	73.7	10.5	2.6	-	-	-	7.9	-	-	63.2	5.3	31.6	10.5	7.9	7.9	5.3	21.1
西多摩	100.0 (3)	100.0	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-	66.7	66.7	-	-	-	-	-	-
南多摩	100.0 (18)	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	66.7	-	-	-	11.1	22.2
北多摩西部	100.0 (5)	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	80.0	-	20.0	-	-
北多摩南部	100.0 (4)	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-	-	75.0	-	-	25.0
北多摩北部	100.0 (8)	62.5	37.5	-	-	-	-	37.5	-	-	25.0	-	-	-	-	25.0	-	37.5